

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Compuestos cúpricos

**FUNGICUP WG**, es un fungicida a base de cobre, y que se considera ligeramente tóxico para los humanos y animales.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal, durante la preparación usar de protección guantes y botas de goma, defantal impermeable, mascarilla y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes y botas de goma, mascarilla, protector facial y traje impermeable.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante jabón.

No contaminar fuentes y cursos de agua.

Conservar el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

**Síntoma de intoxicación:** Dolores de cabeza, dolores estomacales e indigestión entre otros síntomas.

**Antídoto:** realizar tratamiento médico.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua, durante al menos 15 minutos.

**En caso de contacto ocular:** Lavar con abundante agua limpia durante a lo menos 15 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata. El polvo puede ser irritante por contacto o inhalación.

**En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. En caso de ser necesario busque atención médica.

**En caso de ingestión:** Nunca dar algo por la boca si la persona esta inconsciente o convulsionando. No inducir el vómito. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

**Tratamiento médico en caso de ingestión:** ABC de reanimación, lavado gástrico. Dar carbón activado y catártico salino.

Si el paciente está sintomático suministrar:

BAL (Dimercaprol) 3-5 mg/kg/dosis

Penicilamina 250 mg 4 veces al día por 5 días.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS**

**En caso de intoxicación llamar:  
Centro de Atención toxicológica UC,  
Teléfono: (02) 635 3800 (atención 24 horas)**

**Agrospec S.A. (02) 836 8000**

# FUNGICUP WG

**Fungicida-Bactericida Cúprico  
Gránulos Dispersables (WG)**

**FUNGICUP WG**, es un fungicida-bactericida de amplio espectro, destinado al control preventivo de las enfermedades y en los cultivos presentes en las recomendaciones de uso de esta etiqueta.

### COMPOSICION:

<b>Ingrediente Activo:</b>	<b>%p/p</b>
<b>Oxicloruro de Cobre(*)</b>	<b>87,0%</b>
<b>Inertes y adyuvantes c.s.p.</b>	<b>100,0%</b>
<b>(*) Equivalente a 50% en contenido de Cobre</b>	

**AUTORIZACION DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO N° 2460**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°

Cont. Neto: 1Kg.

Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:



Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago

Teléfono (56-2) 836 8000

Fax(56-2) 535 8020

www.agrospec.cl

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

### Descripción:

**FUNGICUP WG**, es un fungicida-bactericida de amplio espectro destinado al control preventivo de enfermedades en frutales y hortalizas.

### Instrucciones de uso:

En el estanque de aplicación a medio llenar y con el agitador en funcionamiento, agregar en forma lenta la cantidad requerida de FUNGICUP WG.

Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar el agua restante manteniendo la agitación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Duraznero Nectarino Ciruelo Almendro	Tiro de Murchion, Cáncer bacterial, Cloca	300-500g/ 100 L. de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Guindo Cerezo	Cloca, Cáncer bacterial	300-500g/ 100 L. de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes.
Manzano	Cancro europeo	300-500g/ 100 L. de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Peral	Tizón bacteriano	300-500g/ 100 L. de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Nogal	Peste negra	400-500g/ 100 L. de agua	1 <sup>era</sup> : inicios de brotación 2 <sup>da</sup> : inicios de floración 3 <sup>ra</sup> : con 25% de flor pistilada 4 <sup>ta</sup> : a finales de floración
Pomelo Mandarino Limón Naranja	Pudrición parda	300-500g/ 100 L. de agua	Aplicar antes o inmediatamente después de las primeras lluvias, repetir en caso de lluvias frecuentes.
Vides	Mildiú	300g/ 100 L. de agua	Aplicar desde inicios de brotación. Si las lluvias persisten (condiciones predisponentes de infección) repetir cada 7 - 10 días. No aplicar en floración
Papa* Tomate**	Tizón temprano Tizón tardío	3 - 5 Kg/há	Aplicar después que el cultivo alcance los 15cm de altura y repetir cada 15 días hasta que finalice la floración.

Se recomienda realizar un máximo de 5 aplicaciones en la temporada, dependiendo de las condiciones y del cultivo que se trate.

La frecuencia de aplicación esta sujeta a la condición de caída de hoja principalmente, pero esta no debe ser superior a 15 días.

Los mojamientos dependen del cultivo y de la enfermedad, y varían de 1500 a 2000 L/há.

**Carencia: (días)**

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

**Fitotoxicidad:**

**Incompatibilidad:** Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, sin embargo evitar aplicarlo con Thiram y Dinitros.

**Reingreso al área tratada:**

24 horas después de ser aplicado.

**Nota del fabricante:**

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



**CUIDADO**

