

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Aminas ácidas

**GLIFOSPEC 48% SL**, es un herbicida sistémico, y que se considera ligeramente tóxico para los humanos y animales.

**Precauciones de uso:** dañino si es ingerido. Evitar el contacto con la piel, ojos, ropa y la inhalación de la bruma en la aplicación.

No beber, fumar y comer durante la manipulación y aplicación del producto. **Equipo de protección personal:** Durante su manipulación vestir guantes y botas de goma, overol y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes y botas de goma, overol y protector facial. Lavarse con agua y jabón después de estar en contacto con el producto.

No aplicar de un modo directo o por deriva a trabajadores expuestos u otras personas. No contaminar alimentos, pastos, fuentes ni cursos de agua.

Conservar el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

A la dosis de aplicación recomendada, Glifospec 48% SL no es dañino al medio ambiente, ni peligroso a peces, aves y abejas.

**Síntomas de Intoxicación:** Dolores de cabeza, dolores estomacales e indigestión entre otros síntomas.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento base.

**Primeros auxilios:**

**En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración alojando las ropas. Si existe irritación respiratoria o si la respiración se hace dificultosa, llamar un médico.

**En caso de ingestión:** Tratamiento sintomático. No inducir vómito. Para esto, mantener la cabeza bajo el nivel de las rodillas para evitar el riesgo de aspiración. No dar nunca algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Consequir ayuda médica inmediatamente.

**En caso de contacto ocular:** Lavar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata.

**En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua y jabón la zona contaminada. Remover la ropa contaminada. Consequir atención médica si la irritación persiste.

**Tratamiento médico de emergencia:** Tratar a los pacientes sintomáticamente.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES. INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS**

**En caso de intoxicación llamar a:**  
Centro Atención Toxicológica UC  
teléfono: (02) 635 38 00 (24 horas)  
Agrospec S.A.: (02) 836 80 00

# Glifospec 48% SL

Herbicida Sistémico  
Concentrado Soluble (SL)

GLIFOSPEC 48% SL, es un herbicida sistémico no selectivo, utilizado en el control de las malezas anuales y perennes especificadas en las instrucciones de uso de esta etiqueta, y en los cultivos señalados.

### COMPOSICION:

**Ingrediente Activo:** % p/v

Glifosato(\*) 48%  
Inertes y adyuvantes c.s.p. 100%  
(\*) Sal isopropilamina de N-fosfonometilglucina

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3285**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: 1L.

Fecha Venc.:

**FABRICADO POR:**

**KINGTAI CHEMICALS CO. LTD. ANHUI KOYO IMP & EXP. CO. LTD**  
4-A, Building B, Yuanyang Building 699 West Changjiang Rd.  
Jiaxing Zhejiang, China Hefei, China

**TRUSTCHEM CO. LTD.**  
D2 23 Floor Golden Eagle  
International Plaza, 89 Hanzhong  
Rd, Nanjing, 210029, China.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

 **Agrospec**

**Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago - Chile**  
Teléfono (56-2) 836 80 00 • Fax (56-2) 535 80 20  
www.agrospec.cl

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:** GLIFOSPEC 48% SL, es un herbicida sistémico no selectivo, muy eficaz en el control de malezas anuales y perennes, tanto póaceas como hoja ancha.

**Instrucciones de uso:** Equipo de aplicación: No existe restricción para el equipo de aplicación. Utilizar con volumen de agua nunca superior a 150 litros de agua por hectárea.

Preparación de la mezcla: Si el equipo a utilizar posee un buen agitador, agregar la dosis recomendada directamente dentro del estanque a medio llenar, agregar luego el resto del agua hasta completar la carga; de lo contrario en un balde con agua, disolver la dosis requerida y vaciar esta solución al estanque a medio llenar. Efectuar esta operación con el agitador funcionando y completar la carga con el agua restante.

MALEZAS	DOSIS L/há	OBSERVACIONES	CULTIVOS
<b>Maleza anual de hoja angosta</b> Pata de gallina Ballicas, Pega-Pega, Pasto del Perro Hualcacho	1,5 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0	No subsosificar las dosis recomendadas, asperjar en estados tempranos de desarrollo y en el caso de malezas más rebeldes aplicar las dosis mayores.	Duraznero Damasco Nectarino Almendro Ciruelo Guindo Cerezo Manzano Peral Peral asiático Membrillo Limon Naranja Pomelo Mandarina Clementina Vides y Parronales
<b>Maleza anual de hoja ancha</b> Bledo, Chamico, Rábano, Verdolaga, Quinquilla, Manzanilla, Yuyo, Sanguinaria, Ortiga, Malva	2,0 – 4,0	No subsosificar las dosis recomendadas, asperjar en estados tempranos de desarrollo y en el caso de malezas más rebeldes aplicar las dosis mayores.	Nogal Olivo Palto Kiwi Frambueso Arándano Mora Zarzaparrilla Cero y mínima labranza
<b>Maleza perenne de hoja ancha</b> Falso te, Correhuela Galega	3,0 – 4,0 4,0 – 6,0	Para un control ideal aplicar en prefloración.	
<b>Maleza perenne de hoja angosta</b> Pasto cebolla Maicillo Chepica gigante Junquillo Pasto bermuda	2,5 – 3,5 3,5 – 4,0 4,0 4,0 – 6,0 4,0 – 6,0	Debe ser aplicado idealmente a inicio de floración. Aplicar cuando el estolón tenga entre 11 y 15 cm.	
Chufa	6,0 – 7,0	Aplicar luego de la brotación (25-30 días, aproximadamente) en el estado de 9 a 11 hojas.	
<b>Malezas herbáceas y arbustivas</b> Zarzamora, Retamillo, Tolora, Maqui, Bacharis, Espino	4,0 – 10,0	Aplicar pre y post plantación de las praderas y forestales.	Plantaciones forestales Regeneración de praderas

**Precauciones:** Las aplicaciones deben ser dirigidas únicamente a la maleza emergida en pleno crecimiento. No mojar el follaje de frutales, vides o cultivos donde resulta fitotóxico. Por lo tanto, la aplicación debe ser selectiva. Se aconseja no aplicar más de 15 L de ingrediente activo de Glifosato al año.

**Carencia:** Manzano, Peral, Peral asiático, Membrillo, Limón, Naranja, Pomelo, Mandarina, Clementina: 1 días. - Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro, Ciruelo, Cerezo, Guindo, Vides y Parronales, Kiwi, Frambueso, arándano, Mora, Zarzaparrilla: 7 días. - Nogal, Olivo, Palto: 3 días – Cero y mínima labranza, plantaciones forestales y regeneración de praderas: no corresponde.

**Fitotoxicidad:** Fitotóxico a todos los cultivos si no se tiene precaución con la deriva del producto.

**Incompatibilidad:** Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

Para mejorar el espectro de GLIFOSPEC 48% SL, es recomendable utilizar un coadyuvante, especialmente en climas lluviosos donde Glifosato puede ser lavado por agua.

**Reingreso al área tratada:** Luego de 4 horas de realizada la aplicación.

**Nota del fabricante:** El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

## CUIDADO

