

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Dicarboximida y Azufre

IproDust, es un fungicida a base de Iprodione y Azufre, considerado ligeramente tóxico para los humanos y animales. No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de Protección Personal: Utilizar de protección: guantes y botas de goma, respirador con filtro para polvos, lentes y traje impermeable. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega exclusiva para productos fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes. A la dosis de aplicación recomendada, **IproDust**, es moderadamente tóxico a organismos acuáticos y prácticamente no tóxico a aves y abejas.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: No existe antídoto conocido

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: Hacer lavado gástrico. Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. No inducir el vómito. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de contacto ocular: Limpiar los ojos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Si la víctima usa lentes de contacto, sacárselos. El polvo puede ser irritante por contacto o inhalación.

En caso de contacto cutáneo: Remover las ropas contaminadas, lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón. Conseguir atención médica si la irritación persiste. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS

En caso de intoxicación llamar :
Centro Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)
Agrospec S.A.: (02) 836 8000

I PRODUST

Fungicida
Polvo Seco (DP)

I PRODUST, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de Moho gris (*Botrytis cinerea*) y Oídio (*Uncinula necator*) en Vides.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo:	% p/p
Iprodione*	5.0 %
Azufre	95.0 %
Total	100.0 %

* 3-(3,5-dicloro fenil)-N-(1-metiletil)-2,4-dioxo-1-imidazolin-carboximida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2654

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 836 8000
Fax (56-2) 535 80 20
www.agrospec.cl

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

IproDust, es un fungicida de contacto preventivo, recomendado para el control de *Botrytis cinerea* y Oídio, gracias a la presencia de Iprodione y Azufre en la mezcla, respectivamente.

Instrucciones de uso:

Equipo de aplicación: Espolvoreador terrestre.
Preparación de la mezcla: Para cada una de las aplicaciones, agregar **IproDust** al estanque del espolvoreador y aplicar.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Botritis, Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Oídio <i>Uncinula necator</i>	18-20 kg/há	Aplicar entre Pinta y precosecha, fijándose en las carencias y tolerancias. La última aplicación de precosecha, aplicar la dosis más alta.
	Botritis, Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	22 kg/há	En caso de lluvias o condiciones predisponentes para el desarrollo de <i>Botrytis cinerea</i> , se recomienda aplicar inmediatamente una vez seca la superficie.

Precauciones:

Para evitar el desarrollo de razas resistentes de *Botrytis cinerea* se recomienda usar **IproDust** en alternancia con fungicidas de diferente modo de acción y no realizar más de 3 aplicaciones de **IproDust** en la temporada.

En las aplicaciones observar carencia.

No aplicar dos semanas antes o después de un aceite o de un producto formulado como Emulsión concentrada (EC).

Carencia: (días)

Vides: 8 días.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Incompatibilidad:

Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, sin embargo evitar aplicar con Thiram, productos alcalinos y ácidos. No aplicar con Clorpirrifos y con formulaciones que contengan aceites.

Reingreso al área tratada:

24 horas después de ser aplicado.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

