

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Azufre

**Sulfur 80 WP** es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: no comer, beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipar de protección personal, durante la preparación usar de protección, guantes y botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes y botas de goma, protector facial, traje impermeable.

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Conserve el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Síntomas de intoxicación:** en caso de contacto prolongado, se produce conjuntivitis e irritación cutánea, bronquitis con expectoraciones.

**Antídoto:** No es un producto tóxico. Sin antídoto específico.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de contacto cutáneo:** Retirar las ropas contaminadas y lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón, en caso de ser necesario acudir a un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

**En caso de contacto ocular:** Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista.

**En caso de inhalación:** Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, si se requiere dar respiración artificial, llamar a un médico.

**En caso de ingestión:** No inducir al vómito, lavar la boca con agua. Nunca de ingerir o beber a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en forma inmediata.

**Tratamiento médico de emergencia:** No posee antídoto. Realizar tratamiento de acuerdo a sintomatología.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**NO UTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS**

**En caso de intoxicación llamar :  
Centro Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)  
Agrospec S.A.: (02) 836 8000**

# SULFUR 80 WP

Fungicida  
Polvo Mojable (WP)

**Sulfur 80 WP**, es un fungicida preventivo de contacto destinado al control de oidio en uva de mesa y vid para vinificación, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, frambueso, hortalizas, remolacha y plantas ornamentales, citadas en las instrucciones de uso.

### COMPOSICION:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ingrediente Activo:</b> | <b>% p/p</b> |
| Azufre                     | 81,0%        |
| Inertes y adyuvantes c.s.p | 100,0%       |

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2721

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto:      kg.      Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile  
Teléfono (56-2) 836 8000  
Fax (56-2) 535 80 20  
www.agrospec.cl

**INFLAMABLE – CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:** Sulfur 80 WP es un fungicida preventivo, controla oidio en forma preventiva en duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, frambueso, uva de mesa y vid para vinificar, remolacha azucarera, hortalizas y plantas ornamentales.

**Preparación de la mezcla:** Disolver la cantidad requerida de Sulfur 80 WP usando sólo un 20% del volumen del estanque, luego se vierte en el estanque a medio llenar del equipo y con el agitador funcionando, posteriormente completar el estanque con agua, agitando constantemente.

**Equipo de aplicación:** Pulverizador, Nebulizador o Bomba de espalda. Al usar nebulizadoras de bajo volumen se deben aplicar las dosis más altas, de modo de aplicar correctamente la dosis por hectárea sugerida.

**Instrucciones de Uso:**

| CULTIVO  | PLAGA  | DOSIS g/100 L   | OBSERVACIONES  |
|--|--|---|--|
| Víñas y Parronales   | Oidio<br><i>Erysiphe necator</i>   | 200 - 300   | Aplicar preferentemente como preventivo. Iniciar en brotes de 10 – 15 cm de largo y repetir cada 8 días. Usar mojamientos de 1.500 a 2.000 L/ha de agua. En postcosecha, previo a la caída de las hojas, de ser necesario realizar una o dos aplicaciones. N° aplicaciones por temporada: 10. Usar la dosis máxima en condiciones favorables a una presión máxima de ataque. |
| Duraznero<br>Nectarino<br>Ciruelo  | Oidio<br><i>Sphaerotheca pannosa</i>   | 300 - 400   | En duraznero y nectarino aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. Usar mojamientos de 1.500 a 2.000 L/ha de agua. N° aplicaciones por temporada: 3.   |
|  | Roya Polvillo<br><i>Tranzchelia discolor</i>   | 250-300   | Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Repetir si fuera necesario luego de 10 a 15 días. Usar mojamiento de 1.500 L/ha de agua. N° aplicaciones por temporada: 3.  |
| Manzano  | Oidio<br><i>Podospaera leucotricha</i>   | Prefloración:<br>400 - 600<br>Postfloración:<br>200 - 300 | Primera aplicación en caída de pétalos. Repetir si fuera necesario cada 10 – 14 días. Aplicaciones deben hacerse previo a cambio de color de la fruta. En variedades rojas, no aplicar en mezcla con Captan. Usar mojamiento de 1.500 L/ha de agua. N° aplicaciones por temporada: 3.  |
| Melón<br>Sandía<br>Pepino<br>Zapallo<br>Zapallo italiano                   | Oidio<br><i>Golovinomyces cichoracearum</i>  | 4 -5 kg/ha  | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 2. Usar 400 L/ha de agua.   |
| Tomate,<br>papa<br>Alcachofa   | Oidio, peste ceniza<br><i>Golovinomyces cichoracearum</i><br><i>Leveillula taurica</i> | 4 -5 kg/ha  | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 3. Usar 400 L/ha de agua.   |
| Arveja,<br>frejol  | Oidio<br><i>Erysiphe poligony</i>  |   | Aplicaciones por temporada: 2  |
| Frambueso  | Oidio<br><i>Podospaera macularis</i>   | 250-350   | Aplicar desde la aparición de los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 2. Usar 600 – 800 L/ha de agua de acuerdo al follaje.   |
| Plantas ornamentales (Rosas, claveles, crisantemos, gladiolos, hortensias) | Oidio<br><i>Sphaerotheca pannosa</i>   | 4 -5 kg/ha  | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 2. Usar 200 L/ha de agua.   |
| Remolacha azucarera  | Oidio<br><i>Erysiphe poligony</i>  | 4 -5 kg/ha  | Preventivo o al observar los primeros signos. Repetir a los 15 días. N° aplicaciones por temporada: 2. Usar 200 – 400 L/ha de agua.  |

**Precauciones:** No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo ( $t^{\circ} > 25^{\circ}C$ ) o alta humedad ambiental.

**Fitotoxicidad:** No aplicar en Damascos por ser fitotóxico a este frutal. El producto no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis recomendadas.

**Incompatibilidad:** Es incompatible con Formetanate HCL. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

**Tiempo de Reingreso:** 24 horas después de ser aplicado; para animales no corresponde, porque el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

**Permanencia (días):** Sin restricciones.

**Nota del fabricante:** El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expone dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



**CUIDADO**

