

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Triazoles/Sales de cobre

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de Protección Personal: Durante la aplicación utilizar protector facial, overol impermeable, botas y guantes de goma. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes. A la dosis de aplicación recomendada, **Podaspec Cu** es prácticamente no tóxico para aves y moderadamente tóxico para abejas y organismos acuáticos. Una vez vacíos los envases, realizar triple lavado de los envases agregando agua al recipiente hasta un cuarto de su volumen, agitar bien y eliminar, lo cual debe repetirse tres veces, una vez realizada la técnica los envases deben destruirse.

Síntomas de Intoxicación: Tos, irritación nasal, vómitos, diarrea, irritación dérmica y enrojecimiento, lagrimeo e irritación de ojos.

Antídoto: Dimercaprol 3-5 mg/kg/dosis, Penicilamina 250 mg cada 8 horas.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: No inducir al vómito, lavar la boca con agua. Nunca de a ingerir o beber a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en forma inmediata

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. Acudir a un médico especialista.

En caso de contacto cutáneo: Retirar las ropas contaminadas y lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten acudir a un médico especialista.

En caso de inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, si se requiere dar respiración artificial, llamar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación, dilución con 120-140 ml de agua o leche, lavado gástrico, utilizar carbón activado y catártico salino. Manejar la hipotensión con volumen o drogas vasoactivas. Si el paciente está sintomático utilizar un agente quelante (Dimercaprol) 3-5 mg /kg/dosis. Penicilamina 250 mg cada 8 horas. Obtener un hemograma, test de función hepática y renal y niveles plasmáticos de cobre.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar :
Centro Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)
Agrospec S.A.: (02) 836 8000

PODASPEC Cu

Fungicida
Pasta (PA)

PODASPEC Cu, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de hongos que afectan la madera de durazneros citados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos: % p/v

Tebuconazol (*) 0,5%

Sulfato tribásico de cobre (**) 0,58%

Coformulantes c.s.p. 100,0%

(*) (R,S)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-3-pentanol
(**) Equivalente a 0,3% cobre metálico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2737

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: L. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 836 80 00
Fax (56-2) 535 80 20
www.agrospec.cl

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: **PODASPEC Cu**, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de hongos que afectan la madera de durazneros, indicados a continuación.

Equipo de aplicación: Pintura.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Duraznero	Enfermedades de la madera Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i>	En plantas de vivero pintar la herida de injertación y de decapitación del patrón. En plantas adultas, pintar los cortes de poda de más de dos años de edad.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.

Preparación de la mezcla:

Agite el envase antes de usar. Producto listo para aplicar.

Carencia (días):

No corresponde por el periodo de aplicación.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y condiciones estipuladas en las recomendaciones propuestas.

Incompatibilidad:

Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común. Sin embargo, evitar aplicar con productos de marcada acción ácida o alcalina y aceites minerales.

Tiempo de reingreso al área tratada:

Sin restricciones para el ingreso de personas. Para animales no corresponde por no ser un cultivo destinado a la alimentación animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

