

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

### Grupo Químico: Dicarboximida.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

**Equipo de Protección Personal:** Durante la aplicación utilizar anteojos de seguridad, guantes, trajes PVC, mascarilla con filtro para polvos finos y botas. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

**Síntomas de Intoxicación:** Tos, irritación nasal, vómitos, diarrea, irritación dérmica y enrojecimiento, lagrimeo e irritación de ojos.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**Iprodust Wine** no es dañino al medio ambiente, es ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

### Primeros auxilios:

**En caso de ingestión:** Inducir al vómito dando a beber 2-3 vasos de agua o leche, dicha maniobra debe ser realizada por una persona especializada, lavar la boca con agua. Nunca de ingerir o beber a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en forma inmediata.

**En caso de contacto ocular:** Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista.

**En caso de contacto cutáneo:** Retirar las ropas contaminadas y lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten acudir a un médico especialista.

**En caso de inhalación:** Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, si se requiere dar respiración artificial, llamar a un médico.

**Tratamiento médico de emergencia:** si se ha ingerido una gran cantidad de fungicida durante las últimas horas, y no ha ocurrido vómito copioso, sería razonable considerar el método de descontaminación gastrointestinal. Puede usarse carbón activado añadiéndole el catártico sorbitol a la suspensión de carbón. Si se suministra sorbitol separadamente, este debe diluirse con una cantidad equitativa de volumen de agua antes de ser administrado.

No se recomienda más de una dosis del catártico sorbitol y debe usarse con cautela en los niños y ancianos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar :  
Centro Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)  
Agrospec S.A.: (02) 836 8000

# iproduct wine

Fungicida  
Polvo Seco (DP)

Iprodust Wine, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de moho gris (*Botrytis cinerea*) en vides.

### COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:	% p/p
Iprodione*	5,5%
Inertes c.s.p.	100,0%

(\*) 3-(3,5-dicloro fenil)-N-(1-metiletil)-2,4-dioxo-1-imidazolín-carboximida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2732

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile  
Teléfono (56-2) 836 8000  
Fax (56-2) 535 80 20  
www.agrospec.cl

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO

### Descripción:

**Iprodust Wine**, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de moho gris en vides.

Equipo de aplicación: Espolvoreo terrestre.

### Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Botritis, Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	18-20 kg/há	Aplicar entre pinta y precosecha, fijándose en las carencias y tolerancias. No deben transcurrir más de 7 a 10 días entre aplicaciones, realizando un máximo de 2 aplicaciones en la temporada y siendo la última aplicación de precosecha la dosis más alta.

**Preparación de la mezcla:** Para cada una de las aplicaciones, agregar **Iprodust Wine** al estanque del espolvoreador y aplicar.

**Carencia (días):** 3 días.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y condiciones estipuladas en las recomendaciones propuestas.

**Incompatibilidad:** Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 24 horas después de la aplicación para personas, para animales no corresponde por ser un cultivo no destinado a la alimentación animal.

**Nota del fabricante:** El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



## CUIDADO

