


| | |
|--------------------------------|--|
| NOMBRE COMÚN | SULFUR 80 WP |
| INGREDIENTE ACTIVO | Azufre |
| NOMBRE QUIMICO | Azufre |
| GRUPO QUIMICO | Calcógeno |
| TIPO FORMULACIÓN | Polvo Mojable |
| COMPOSICIÓN | Azufre 81.0 % Inertes y adyuvantes c.s.p. 19.0 % Total 100.0 % |
| MODO DE ACCIÓN | Contacto |
| FORMULADOR | Agrospec S.A. |
| FORMULADOR/DISTRIBUIDOR | Agrospec S.A. |
| TOXICIDAD | Grupo IV., producto que normalmente no ofrecen peligro |
| AUTORIZACIÓN SAG | 2721 |

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

SULFUR 80 WP, es un fungicida preventivo de contacto, destinado al control de oídio en parronales y viñas, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, frambueso, hortalizas y plantas ornamentales.

RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS g/100 L | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|
| Viñas y parronales | Oídio <i>Erysiphe necator</i> | 200-300 | Aplicar preferentemente como preventivo. iniciar brotes de 10-15 cm. de largo y repetir cada 8 días. Usar mojamiento de 1.500 a 2.000 L/ha de agua. En postcosecha, previo a la caída de las hojas, de ser necesario, reralizar una o dos aplicaciones. Nº de aplicaciones por temporada: 10 Usar las dosis máximas en condiciones favorables a una presión máxima de ataque. |
| Duraznero Nectarino Ciruelo | Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> | 300-400 | En duraznero y nectarino aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. Nº aplicación por temporada: 3. Usar 1500 a 2.000 L/ha de agua. |
| | Roya, Polvillo <i>Tranzchelia discolor</i> | 250-300 | Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Repetir si fuera necesario luego de 10 a 15 días. Nº de aplicaciones por temporada: 3 Usar 1500 L/ha de agua |
| Manzano | Oídio <i>Podosphaera leucotricha</i> | Prefloración: 400 - 600 Postfloración: 200-300 | Primera aplicación en caída de pétalos. repetir si fuera necesario cada 10 - 14 días. Aplicaciones deben hacerse previo a cambio de color de fruta. En variedades rojas, no aplicar en mezcla con Captan. Usar 1.500 L/ha de agua. Nº de aplicaciones por temporada: 3 |
| Melón Sandía Pepino Zapallo Zapallo italiano | Oídio <i>Golovinomyces cichoracearum</i> | 4-5 kg/ha | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Nº de aplicaciones por temporada: 2 Usar 400 L/ha de agua. |



| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS g/100 L | OBSERVACIONES |
|---|--|---------------|---|
| Tomate Papa Alcachofa | Oídio, peste ceniza <i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i> | 4 - 5 kg/ha | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Nº de aplicaciones por temporada: 3 Usar 400 L/ha de agua. |
| Arveja, frejol | Oídio <i>Erysiphe poligony</i> | | Aplicaciones por temporada: 2 |
| Frambueso | Oídio <i>Podosphaera macularis</i> | 250 - 350 | Aplicar desde la aparición de los primeros signos. Nº de aplicaciones por temporada: 2 Usar 600-800 L/ha de agua de acuerdo al follaje. |
| Plantas ornamentales (Rosas, Claveles, Crisantemos, Gladiolos, Hortensias, etc.). | Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> | 4 - 5 kg/ha | Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Nº de aplicaciones por temporada: 2 Usar 200 L/ha de agua. |
| Remolacha Azucarera | Oídio <i>Erysiphe poligony</i> | 4 - 5 kg/ha | Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros signos. Repetir a los 15 días. Nº aplicaciones por temporada: 2 Usar 200 – 400 L/ha de agua. |

OBSERVACIONES:

Sulfur 80 WP, es un producto exento de tolerancias, por lo tanto, no tiene restricción de carencias. El producto debe ser aplicado con pulverizador, nebulizador o bomba de espalda. El tiempo de reingreso al área tratada es de 24 horas.

PRECAUCIONES:

No aplicar con viento fuerte, sin lluvia o garúa o alta humedad ambiental, ni con calor excesivo (temperatura mayor a 25°C).

Es incompatible con Formetanate HCl. No mezclar con productos de marcada acción ácida o básica, como así también, productos como pyrinex, dimetoato, thiram, dinitros, polisulfuro de calcio y aceites. Deben transcurrir tres semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.