

NOMBRE COMÚN	PODASPEC	
INGREDIENTE ACTIVO	Tebuconazol	
GRUPO QUIMICO	Triazol	
TIPO FORMULACIÓN	Pasta (PA)	
COMPOSICIÓN	Tebuconazol	0,5%
	Coformulantes	99,5%
	Total	100.0%
MODO DE ACCIÓN	Preventivo de contacto	
FABRICANTE/DISTRIBUIDOR	AGROSPEC S.A.	
TOXICIDAD	Grupo IV, Producto que normalmente no ofrece peligro.	
AUTORIZACIÓN SAG	2736	

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

PODASPEC, Es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de hongos que afectan la madera de carozos, pomáceas, vides y berries.

Formulado en base a Latex de alta elasticidad y persistencia, con filtro UV que protege el ingrediente activo de la radiación solar.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Ciruelo Cerezo Duraznero Nectarino Damasco Almendro	Enfermedades de la madera Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i>	En plantas de vivero pintar la herida de injertación y de decapitación del patrón. En plantas adultas, pintar los cortes de poda de más de dos años de edad.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.
Arándano Frambueso Mora	Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i>	Pintar sobre la herida o corte de poda.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.
Manzano Peral Peral asiático	Enfermedades de la madera Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i>	Pintar sobre la herida de injertación, decapitación y corte de poda.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.
Manzano	Cancro europeo <i>Nectria galligena</i>	Pintar una vez eliminado el cancro.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de la extirpación del cancro.
Vides	Enfermedades de la madera: Enrollamiento clorótico <i>Fomitiporella vitis</i> Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i> Brazo muerto de la vid <i>Botryosphaeria sp.</i> Mal del pie negro de la vid <i>Cylindrocarpon destructans</i>	Pintar sobre la herida de injertación, decapitación y corte de poda.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.
Kiwi	Enfermedades de la madera: Enrollamiento clorótico <i>Fomitiporella vitis</i> Plateado <i>Chondrostereum purpureum</i> Brazo muerto de la vid <i>Botryosphaeria sp.</i>	Pintar sobre la herida de injertación, decapitación y corte de poda.	Tratamiento invernal, aplicar inmediatamente después de realizado el corte, cubriéndolo completamente.

OBSERVACIONES:

Agite el envase antes de usar. Producto listo para aplicar.
No corresponde carencias por el período de aplicación.

PRECAUCIONES:

Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común. Sin embargo, evitar aplicar con productos de marcada acción ácida o alcalina y aceites minerales. No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y condiciones estipuladas en las recomendaciones propuestas en la etiqueta.

Para el tiempo de reingreso, no posee restricciones para el ingreso de personas. Para animales tampoco posee restricciones de ingreso, debido a que los cultivos en los que está indicado el uso de **Podaspec**, no están destinados a la alimentación animal.