

33 EC Pendimetalin

Herbicida residual de amplio espectro

- Para aplicación en presiembra o pre-emergencia.
- Control de malezas eficiente y eficaz en frutales y hortalizas.

Pendimetalin 33% EC, reg. SAG 3559



Camino El Milagro 257, Maipú
Santiago, Chile
Fono: (56-2) 836 8000
Fax: (56-2) 535 8020
www.agrospec.cl

33 EC Pendimetalin

Pendimetalin 33% EC es un herbicida residual de presembrado, pretrasplante o preemergencia, ampliamente utilizado en programas de control de malezas en frutales y hortalizas.

Pendimetalin 33% EC controla malezas anuales de hoja ancha y gramíneas durante 60 a 90 días, según dosis, tipo de suelo y cultivo. Su baja descomposición por la luz y baja volatilidad permiten una aplicación más flexible.

Uso Eficiente

Para obtener un uso eficiente de **Pendimetalin 33% EC**, considere lo siguiente:

- Aplicar antes de la emergencia de malezas.
- Utilizar 200 a 400 L/ha de agua.
- Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelo livianos.
- Incorporar al suelo mecánicamente o aplicar previo a una lluvia o riego.

Precauciones

- Puede ser fitotóxico si es aplicado en suelos arenosos y las lluvias o el riego lo transportan hasta la semilla en germinación.
- No trasplantar plantas producidas en speedling sobre melgas tratadas en superficie con Pendimetalin 33% EC.
- No controla malezas establecidas ni perennes.
- Es compatible con simazina, oxifluorfen, glifosato, linuron, paraquat, metribuzina, metabenzthiazuron, prometrina y aminotriazol. Es incompatible con productos alcalinos u oxidantes.

Recomendaciones de uso:

Malezas de hoja ancha: Alfilerillo, Bledo, Bolsita del Pastor, Calabacillo, Cerastio, Duraznillo, Hierba de la Culebra, Hierba Mora, Lengua de Gato, Ortiga Muerta, Pasto Pinito, Porotillo, Quinquilla, Sanguinaria, Verdolaga y Verónica.

Malezas gramíneas: Ballica, Hualcacho, Maicillo de semilla, Pasto de la Perdiz, Pata de Gallina y Pega-Pega.

Cultivo	Dosis L/há	Observaciones
Vid, Manzano, Peral, Membrillo, Ciruelo, Duraznero, Nectarino, Damasco, Cerezo, Almendro, Palto, Naranja, Limonero, Pomelo, Mandarino, Tangerina, Tangelo, Lima, Kiwi, Nogal, Frambueso, Arándanos, Olivo, Níspero, Caqui	4 - 4,5	Se puede aplicar desde el primer año de plantación como tratamiento invernal. Se debe aplicar en preemergencia de las malezas, para ser incorporado por lluvias o riego. Para controlar malezas en surcos de riego durante primavera-verano, aplicar antes de su emergencia y luego regar. Realizar como máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 2 a 3 meses entre ellas.
Alcachofa, Apio, Cebolla, Puerro, Lechuga, Tabaco		Aplicar en pretrasplante e incorporar o bien melgar, aplicar, regar y trasplantar. Preferir la aplicación de pretrasplante incorporado. a) Aplicar una vez durante el cultivo.
Ajo, Papa		Aplicar en preemergencia del cultivo. Aplicar una vez durante el cultivo.
Brócoli, Coliflor, Pimentón, Ají, Radicchio, Repollo, Tomate		En tomate, aplicar en pretrasplante e incorporar. En los demás cultivos también se puede melgar y luego aplicar, regar y trasplantar. Es posible una segunda aplicación en la entrehilera, 60 a 90 días después de la primera aplicación y utilizando dosis de 3-4 L/ha. Preferir la aplicación de pretrasplante incorporado.
Espárragos		Aplicar en preemergencia de los turiones e incorporar con rastraje superficial. Aplicar una vez durante el cultivo.
Eucalipto		Aplicar sobre la banda de plantación, previo a la plantación. Al momento de la plantación cuidar de no llevar suelo tratado a la zona de las raíces. Aplicar una vez por temporada.
Haba, Frejol, Lupino		3 - 4
Arveja	2,5 - 3	No aplicar en suelos arenosos o con menos de 2% de materia orgánica. Aplicar una vez durante el cultivo.