

# FOSFONAT

40-20



**Agrospec**

Camino El Milagro 257, Maipú  
Santiago, Chile  
Fono: (56-2) 836 8000  
Fax: (56-2) 535 8020  
[www.agrospec.cl](http://www.agrospec.cl)

## Composición:

Fosfito de Potasio

$K_2HPO_3$

## Equivalentes de:

Fósforo ( $P_2O_5$ )

40% p/p

Potasio ( $K_2O$ )

20% p/p



## Precauciones de uso:

Fertilizante de baja toxicidad, sin embargo usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, no transportar ni almacenar con alimentos, no lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.

## Nota del fabricante:

El fabricante garantiza que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de su uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

## Principales Características:

**Fosfonat 40-20** es un fertilizante líquido a base de fosfito de potasio el cual es rápidamente absorbido por la planta y tiene la capacidad de traslocarse en forma ascendente y descendente. Su forma de acción se caracteriza por que es capaz de aportar nutrientes como fósforo y potasio, esenciales para la planta, estimulando el crecimiento radicular y de brotes, aumentando la cuaja y mejoramiento de calidad de la fruta; además activa en la planta mecanismos de defensa frente al ataque de diversos patógenos (Resistencia Sistémica Adquirida - RSA).

## Recomendaciones de uso:

Se puede aplicar vía aérea o terrestre, tanto al follaje como al suelo, durante todo el ciclo del cultivo, principalmente en situaciones de estrés.

CULTIVO	DOSIS L/Há	EPOCA DE APLICACION
Vides	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular. Repetir cada 15 a 20 días.
Manzano Peral	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación y repetir cada 30 días, de ser necesario aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias para el desarrollo de alguna enfermedad.
Almendra Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Limonero Naranja Pomelo Mandarino	3 - 5	Aplicar desde el inicio de brotación, cada 20 a 30 días sobre todo si se presentan condiciones favorables de humedad o agua libre.
Frutilla Arándano Frambueso	2 - 4	Aplicar desde el inicio de brotación o en cada flash de crecimiento radicular, repetir cada 15 a 20 días.
Hortalizas	1 - 3	Aplicar en toda la etapa de cultivo, repetir cada 7 a 10 días.
Olivo	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Kiwi	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Nogal	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Palto	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.

## Compatibilidad:

**Fosfonat 40-20** es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, sin embargo, evitar aplicar en mezcla con dicofol, dimetoato, aceites y productos a base de cobre.

