

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Calcógeno.

**Precauciones de uso:**

**AZUFRE 350 AGROSPEC** es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: no comer, beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Durante la aplicación usar de protección, gafas, overol impermeable, botas, guantes de goma y respirador para polvos. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Conservar el producto en una bodega exclusiva para productos fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Antídoto:**

No es un producto tóxico. Sin antídoto específico.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de contacto cutáneo:** Lavar con agua. Buscar asistencia médica si la irritación es persistente.

**En caso de contacto ocular:** Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata. El polvo puede ser irritante a los ojos.

**En caso de ingestión:**

Tratamiento sintomático, si es necesario y los problemas persisten buscar asistencia médica.

**En caso de inhalación:**

Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas, buscar asistencia médica.

**Tratamiento médico:** Tratamiento sintomático, base.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO  
O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR  
Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES  
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO  
CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS,  
RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO  
INDICADO DE REINGRESO**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA  
FITOSANITARIOS**

En caso de intoxicación llamar :

Centro Atención Toxicológica UC  
teléfono: (02) 635 38 00 (24 horas)  
Agrospec S.A.: (02) 836 80 00

# Azufre 350 Agrospec

Fungicida  
POLVO SECO (DP)

Fungicida preventivo de contacto para el control de oídio en los cultivos mencionados en las instrucciones de uso de esta etiqueta, principalmente para parronales y viñas.

**COMPOSICION:**

**Ingredientes Activos:** % p/p

Azufre 95.0 %  
Inertes c.s.p 100 %

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2528

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile  
Teléfono (56-2) 836 80 00  
Fax (56-2) 535 80 20  
www.agrospec.cl

**INFLAMABLE – CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

# INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:**

**AZUFRE 350 AGROSPEC** es un fungicida preventivo de contacto, posee un tamaño de partícula que permite una excelente penetración del producto y una prolongada permanencia en el tiempo en la superficie aplicada.

**Instrucciones de uso:**

Para ser aplicado vía terrestre, esta última por medio de un equipo convencional espolvoreador (AZUFRADORA).

**Instrucciones de uso**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/há	OBSERVACIONES
Viñas y Parronales	Oídio <i>Erysiphe necator</i>	20-25	Aplicar como preventivo. Iniciar con brotes de 10-15 cm. y repetir cada 8-12 días. N° de aplicaciones: 10
Ciruelo Almendro Duraznero Nectarin Manzano Naranja Limonero Mandarino Pomelo Paltos	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> <i>Podospaera leucotricha</i>	20-25	Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 3
Tomate Zapallo Pepino Melón Alcachofa Arveja Frejol Sandía Pimentón Papa Remolacha azucarera	Oídio <i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Erysiphe poligony</i>	20-25	Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 2
Rosas Hortensias Claveles Gladiolos	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i>	20-25	Aplicar de forma preventiva o bien al observar los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 2

**Precauciones:**

Las dosis mayores se deberán aplicar bajo condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad o en casos de mayor presión. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo (t° > 25°C) o alta humedad ambiental. No aplicar en Damascos por ser fitotóxico a este frutal. El producto no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis recomendadas.

**Fitotoxicidad:**

Si es utilizado a las dosis y en los momentos recomendados, el producto no es fitotóxico.

**Incompatibilidad:**

Es incompatible con Formetanate HCL. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

**Tiempo de reingreso al área tratada:**

24 horas después de ser aplicado; para animales no corresponde, porque el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

**Carencia (días):**

Sin restricciones.

**Nota del fabricante:**

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



## CUIDADO

