



AZUFRE 350 AGROSPEC

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| NOMBRE COMUN | : | AZUFRE VENTILADO |
| INGREDIENTE ACTIVO | : | Azufre |
| NOMBRE QUIMICO | : | Azufre |
| GRUPO QUIMICO | : | Calcógenos |
| TIPO DE FORMULACIÓN | : | DP (Polvo seco) |
| COMPOSICIÓN | : | 95% p/p |
| MODO DE ACCION | : | Contacto |
| FABRICANTE / FORMULADOR | : | Agrospec S.A. |
| TOXICIDAD | : | Clase IV. Ligeramente Tóxico |
| AUTORIZACIÓN SAG N° | : | 2528 |

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de Oídio en cultivos susceptibles a la enfermedad, principalmente en parronales y viñas. Esta recomendado para ser aplicado vía aérea y terrestre.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS Kg/há | OBSERVACIONES |
|---|---|----------------|--|
| Viñas y Parronales | Oídio <i>Erysiphe necator</i> | 20 - 25 | Aplicar como preventivo. Iniciar con brotes de 10-15 cm. y repetir cada 8-12 días. N° de aplicaciones: 10 |
| Ciruelo Almendro Duraznero Nectarin Manzano Naranja Limonero Mandarino Pomelo Paltos | Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> | 20-25 | Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 3 |
| Tomate Zapallo Pepino Melon Alcachofa Arveja Frejol Sandia Pimentón Papa Remolacha azucarera | Oídio <i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Erysiphe poligony</i> | 20 - 25 | Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 2 |



| | | | |
|--|-------------------------------------|-------|--|
| Rosas Hortensias Claveles Gladiolos | Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> | 20-25 | Aplicar de forma preventiva o bien al observar los primeros signos. N° de aplicaciones por temporada: 2 |
|--|-------------------------------------|-------|--|

PRECAUCIONES

No aplicar el producto sobre follaje humedecido o en condiciones de alta temperatura (> 25°C) y con viento fuerte.

No aplicar en Peras var. D' Anjou, Damascos y Frambuesas, por problemas de fitotoxicidad.

No ingresar al área tratada antes de 24 horas

No tiene periodo de carencia

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con Morestán y Dicarzol. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.