

# iproduct

# iproductwine

## **Fungicida preventivo y de contacto**

- Recomendado para el control de Botritis y oídio en vides.
- Cortas carencias.

Iproduct, reg. SAG 2654

Iproduct Wine, reg. SAG 2732



**Agrospec**

Camino El Milagro 257, Maipú  
Santiago, Chile  
Fono: (56-2) 836 8000  
Fax: (56-2) 535 8020  
[www.agrospec.cl](http://www.agrospec.cl)

# iproduct iproductwine

**Iproduct** e **Iproduct Wine** son fungicidas preventivos y de contacto, recomendados principalmente para el control de Botritis en vides.

**Iproduct**, además, está complementado con azufre para el control de oídio.

## Modo de acción

**Iproduct** e **Iproduct Wine** son fungicidas del grupo de las dicarboximidaz que actúan por contacto, inhibiendo la germinación de las esporas del hongo y el crecimiento del micelio.

## Uso eficiente

Para obtener un uso eficiente de **Iproduct** e **Iproduct Wine**, considere lo siguiente:

- Aplicar cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. En caso de lluvias, aplicar una vez seca la superficie.
- Aplicar entre inicio de pinta y precosecha.
- Utilizar las dosis mayores cuando la presión de la enfermedad sea alta.
- Alternar con otros fungicidas de distinto modo de acción (ejemplo, Citrus dust) para evitar el desarrollo de razas resistentes de Botritis.

## Formulación

**Iproduct** está desarrollado especialmente para el cultivo de vides de mesa e **Iproduct Wine** para vides viníferas y pisqueras. Ambos productos son:

- Formulados en polvo seco, listos para aplicar vía espolvoreo.
- Fáciles de manipular.
- De baja toxicología.

IPRODUCT	IPRODUCT WINE
Iprodione 5%	Iprodione 5,5%
Azufre 95%	Caolín 85%

## Envase

- Fácil y seguro de almacenar.
- No requiere triple lavado.

## Precauciones

- Esperar 24 horas para reingresar al área tratada sin equipo de protección personal.
- No aplicar contra el viento.

## Recomendaciones de uso

Producto	Cultivo	Enfermedad	Dosis kg/ha	Carencia	Observaciones
<b>Iproduct</b>	Vides de mesa	Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Oídio ( <i>Unicula necator</i> )	18 – 22	8	Máximo 3 aplicaciones en la temporada. No aplicar 2 semanas antes o después de un aceite o emulsión concentrada.
<b>Iproduct Wine</b>	Vides viníferas y pisqueras	Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> )	18 – 20	3	Aplicar 1 a 2 veces por temporada. Utilizar la dosis más alta en la segunda aplicación. No esperar más de 7-10 días entre una aplicación y otra.