

# Paraquat 27.6 SL

# Paraquat

**Herbicida de contacto  
de amplio espectro**

- Para aplicación en post-emergencia de las malezas.
- Control eficiente y eficaz en malezas Gramíneas y de hoja ancha, en frutales y hortalizas.

Paraquat 27.6 SL Agrospec, reg. SAG 3574



 **Agrospec**

Camino El Milagro 257, Maipú  
Santiago, Chile  
Fono: (56-2) 836 8000  
Fax: (56-2) 535 8020  
[www.agrospec.cl](http://www.agrospec.cl)



# Paraquat 27.6 SL

**Paraquat 27.6 SL Agrospec**, es un herbicida post-emergente de contacto, no selectivo, indicado para un amplio espectro de malezas gramíneas y de hoja ancha en frutales, hortalizas, cero y mínima labranza, también como desecante para facilitar cosecha, renovación de empastadas, bordes de camino, canales secos y sitios industriales. Pertenece al grupo químico Bipiridilios.



## Modo de Acción

**Paraquat 27.6 SL Agrospec**, actúa en presencia de luz, desecando las partes verdes de todas la plantas con las que entra en contacto, interfiriendo con la fotosíntesis. Luego de la aplicación, la penetración a través de la hoja se produce casi de inmediato, resistiendo lluvias que pueden caer entre 30 minutos y una hora después de la aplicación.



## Toxicidad

- Prácticamente no tóxico para aves y peces y virtualmente no tóxico a abejas.
- Clasificación toxicológica: Grupo II, Producto moderadamente peligroso.
- Etiqueta con franja de color amarillo.



## Uso Eficiente

Para obtener un uso eficiente de **Paraquat 27.6 SL Agrospec** considere lo siguiente:

- Aplicar con máquina de espalda, aspersores manuales, pulverizadoras en buen estado y correctamente calibradas.
- Usar las dosis mayores como primer tratamiento o para tratar alta presión de malezas y/o para malezas anuales con una altura cercana a los 10 cm.



## Formulación

**Paraquat 27.6 SL Agrospec**, está formulado como Concentrado Soluble (SL). Su contenido es 276 g/L.

## Precauciones

- No aplicar con equipos de ultra bajo volumen ni nebulizadoras.
- Para evitar la aparición de resistencia se recomienda alternar con herbicidas de diferente modo de acción.
- Evitar la deriva del producto hacia las partes verdes de los frutales.
- No debe ser utilizado para el control de preemergencia de las malezas, dado que su acción es de contacto, tampoco utilizarlo en maleza seca o de crecimiento excesivo.
- No aplicar en cultivos o frutales nuevos que pueden ser mojados por la aspersión.
- No aplicar en días de brisa o viento mayor a 5 m/seg, ya que la deriva puede dañar al cultivo o cultivos vecinos susceptibles.
- Extremar los cuidados al preparar la mezcla y aplicar, dado que la intoxicación con paraquat causa problemas respiratorios irreversibles.
- Incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina.

## Compatibilidad

Compatible con simazina, oxifluorfen, glifosato, linuron, pendimetalin, metribuzina, metabenzthiazuron, prometrina y aminotriazol. Antes de la aplicación, realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala, para observar los aspectos físicos de las mezclas y las reacciones sobre las plantas tratadas, en los días posteriores a la aplicación.

## Fitotoxicidad

**Paraquat 27.6 SL Agrospec**, no es fitotóxico si el producto es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

## Carencias

No corresponden carencias para **Paraquat 27.6 SL Agrospec**, ya que es aplicado directamente a las malezas, las cuales lo absorben rápidamente. En cultivos de exportación, determinar las carencias de acuerdo a las tolerancias del país de destino.



Cultivo	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones
<b>Frutales:</b> Vides, Manzanos, Membrillos, Nísperos, Perales, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Durazneros, Guindos, Nectarinos, Almendros, Avellanos, Castaños, Nogales, Pecanos, Pistachos, Clementinas, Limones, Mandarinos, Naranjos, Pomelos, Tangelos, Tangerinas, Limas, Arándanos, Frambuesos, Moras, Zarzaparrillas, Baby-kiwis, Caquis, Chirimoyos, Granados, Higos, Kiwis, Mangos, Olivos, Paltos			Aplicar sobre malezas nuevas o en activo crecimiento, de 3 a 15 cm de altura. No aplicar sobre corteza inmadura o partes verdes de las plantas, dado la no selectividad del herbicida. En huertos jóvenes aplicar con campana protectora de boquillas, mientras la corteza del árbol no se lignifique. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 3 – 6, según requerimientos.
<b>Cero y mínima labranza:</b> Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Trigo, Ajo, Arveja, Betarraga, Cebolla, Espárrago, Frejol, Garbanzo, Haba, Lenteja, Melón, Papa, Remolacha, Tabaco, Zanahoria, Zapallo			Aplicar a la banda o a toda la superficie, con maleza emergida en activo crecimiento de 3 a 15 cm de altura, durante o después de la siembra o plantación, pero antes de la emergencia o establecimiento del cultivo. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 1
<b>Cultivos de siembra directa y almácigos:</b> Acelga, Achicoria, Aji, Ajo, Arveja, Avena, Betarraga, Brócoli, Cebada, Centeno, Endivia, Espinaca, Frejol, Garbanzo, Haba, Lenteja, Maíz, Maravilla, Melón, Nabo, Pepino, Perejil, Pimiento, Poroto verde, Puerro, Rábano, Remolacha, Salsífi, Sandía, Sorgo Soya, Trigo, Triticale, Zanahoria, Zapallo	<b>Malezas hoja ancha anuales:</b> Amor seco, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Hierba cana, Manzanilla, Ortiga, Quinguilla, Rábano, Romaza, Sanguinaria, Verdolaga, Verónica, Vinagrillo, Yuyo.	1,5 – 3,0 (0,75 – 1,0 L/100 L agua)	Aplicar con maleza emergida en activo crecimiento de 3 a 15 cm de altura, durante o después de la siembra, pero antes de la emergencia del cultivo. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 1
<b>Cultivos de plantación o transplante:</b> Acelga, Achicoria, Aji, Ajo, Alcachofa, Apio, Berenjena, Betarraga, Brócoli, Camote, Cebolla, Coliflor, Endivia, Espárrago, Frutilla, Lechuga, Orégano, Papa, Pepino dulce, Pimiento, Puerro, Radicchio, Repollito Bruselas, Repollo, Sandía, Tomate	<b>Malezas hoja ancha perenizadoras:</b> Achicoria, Correhuela, Falso té, Galega, Hierba azul, Malva, Siete venas.		Aplicar con maleza emergida en activo crecimiento de 3 a 15 cm de altura, en preplantación o pretransplante. No aplicar con el cultivo presente. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 1
<b>Entrehilera de cultivos:</b> Alcachofa, Espárrago, Melón, Remolacha, Sandía, Zapallo	<b>Malezas gramíneas anuales:</b> Avenilla, Bromo, Cola de ratón, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pegas, Poa o piojillo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia.		Aplicar con maleza emergida en activo crecimiento de 3 a 15 cm de altura, entre las hileras del cultivo, cuidando no mojar el cultivo, para lo cual es recomendable usar campana protectora de boquillas. Mojamiento: 200 – 300 L/ha. Aplicaciones por temporada: 3 - 5
Praderas de Alfalfa	<b>Malezas gramíneas perennes:</b> Chépica Gigante, Chufa, Junquillo, Maicillo, Pasto bermuda, Pasto cebolla, Pasto quila.		Aplicar durante la latencia invernal de la pradera o inmediatamente después del corte. No aplicar durante el primer año de establecimiento del cultivo. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones durante período de latencia: 3
<b>Desecante foliar:</b> Maíz, Papa, Raps, Trébol, Trigo			Aplicar dos a tres semanas antes de la cosecha o cuando las semillas hayan alcanzado su madurez fisiológica (< 35% de humedad). Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 1
<b>Regeneración de empastadas:</b> Alfalfa, Avena, Trébol.		2,0 – 3,0	Aplicar con maleza emergida en activo crecimiento de 3 a 15 cm de altura. La aplicación es de limpieza y renovación de la pradera, sin realizar labores culturales. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 1
Bordes de caminos, canales y acequias, canales secos, sitios eriazos, correspondiente a zonas de uso agrícola		3,0 – 4,0	Aplicar en toda la superficie, cubriendo muy bien la maleza. En bordes de canales y acequias aplicar sobre los bordes en dirección contraria a la corriente del agua. Repetir de acuerdo a necesidad. Mojamiento: 200 – 300 L/ha Aplicaciones por temporada: 6-8