

NOMBRE COMUN	Kactiv	
INGREDIENTE ACTIVO	Potasio	
FORMULACION	Polvo Soluble (SP)	
COMPOSICION	Potasio (K ₂ O)	% p/p 38,6

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Kactiv es un fertilizante foliar 100% soluble, formulado en base a potasio altamente concentrado, lo que permite una rápida absorción por parte de la planta y/o frutos. Su aplicación mejora la calidad, aspecto, tamaño y uniformidad de los frutos, cuando es aplicado en los momentos oportunos. Además, su rol en la regulación osmótica de las células permite una mejor respuesta de las plantas ante ataques de algunos hongos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Vid de mesa Vid vinífera	150 - 250	Parronal: 2,5 mín. Espaldera: 1 mín.	Aplicar desde inicio de la brotación hasta pinta. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: - Parronal: 1.500 L/ha máx. - Espaldera: 1.200 L/ha máx.
Vid vinífera	250 - 350	Espaldera: 2,8 mín.	Aplicar desde pinta a precosecha con un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha.
Vid de mesa	--	3,75	Aplicar desde pinta a precosecha con equipo electrostático. Mojamiento sugerido: 80 L/ha.
Carozos	200 - 350	3 mín.	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha. Desde pinta, usar la dosis máxima. Utilizar un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo de aplicación: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Mandarino	250	--	Aplicar desde inicio de brotación cada 7 días, mientras exista crecimiento nuevo. Utilizar un mojado acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Máximo 3 aplicaciones por brotación. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.
Arándano	350	2,1 - 3,5	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Utilizar un mojado acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo e aplicación: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.
Frambueso Frutilla	350	2,1 - 2,8	Aplicar desde inicio de floración a precosecha con un mojado acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo e aplicación: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha.
Pimentón Tomate	250 - 400	2 mín.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta antes de la cosecha. Utilizar un mojado acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar con equipos correctamente calibrados.
- Usar un volumen de agua que permita mojar todo el follaje.
- El escurrimiento o sobredosis de producto puede generar depósitos visibles en bayas y frutos.
- No aplicar con temperaturas mayores a 25°C. En mandarinos, no aplicar con temperaturas mayores a 20° C.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar agua al estanque hasta la mitad del volumen requerido, con el agitador en funcionamiento. Luego agregar al estanque la cantidad requerida de **Kactiv**, lentamente. Finalmente, completar el volumen de agua con agitación constante. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución del producto.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.
- Es posible observar temporalmente depósitos blancos sobre bayas o frutos, que desaparecerán con el tiempo.

COMPATIBILIDAD

- Compatible con surfactantes neutros.
- Se recomienda aplicar solo. En caso de requerir mezclar con otros productos, consultar al Depto. Técnico de Agrospec.
- Incompatible con productos de reacción ácida o que no puedan mezclarse con productos de reacción alcalina.
- No se recomienda aplicar en mezcla con productos con acción penetrante.