

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: bifentrina pertenece al grupo químico piretroides. No comer, ni beber o fumar durante su preparación y aplicación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la preparación y aplicación: usar traje impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Evitar contaminar fuentes o cursos de agua. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información ecotoxicológica: a las dosis de aplicación recomendadas, **Bifentrin 100 EC** es perjudicial para lombrices, moderadamente tóxico para daphnias, ligeramente tóxico para algas, extremadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y **MUY TÓXICO PARA ABEJAS**.

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases, agregue agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.

Síntomas de intoxicación: por inhalación se podría producir irritación de todo el sistema respiratorio. Por ingestión puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático. Para descontaminación gastrointestinal, puede usarse carbón activado si la ingesta ocurrió dentro de la hora de exposición.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la víctima usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos, no volver a utilizar los lentes de contacto. Trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.

En caso de contacto cutáneo: retirar ropas y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato, procurando llevar la etiqueta para presentar al personal de salud.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESÍDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA , EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

CONTIENE UN SOLVENTE ORGÁNICO

ÚSESE EN AMBIENTES VENTILADOS

LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD

DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACIÓN

APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER

En caso de intoxicación llamar :
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

BIFENTRIN 100 EC

**Insecticida - Acaricida
Concentrado Emulsionable (EC)**

Bifentrin 100 EC es un piretroide con actividad insecticida y acaricida por contacto e ingestión, no sistémico. Posee buen efecto de choque y persistencia que actúa sobre ácaros y una amplia gama de insectos como lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo: % p/v (g/L)

Bifentrina* 10% p/v (100 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1L)

*(1RS,3RS) - (Z)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 2-metil-bifenil-3-ilmetilo.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1834

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: L. **Fecha Venc.:**

Fabricado, importado y distribuido por:

agrospec®

Camino El Milagro 257
Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000

San Rafael N° 3820 A.
Los Andes. Valparaíso, Chile
agrospec.cl

Fabricado por:

TRUSTCHEM Co. Ltd.
D, 23 Floor Golden Eagle International
Plaza, 89 Hanzhong Rd,
Nanjing, 210029, China.

DESCRIPCIÓN: Bifentrin 100 EC es un piretroide con actividad insecticida y acaricida por contacto e ingestión, no sistémico. Posee buen efecto de choque y persistencia que actúa sobre ácaros y una amplia gama de insectos como lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola, citados en las instrucciones de uso de esta etiqueta. Cuadro de instrucciones de uso terrestre:				
Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones*	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	<i>Proeuilia auraria</i>	20 - 30 cc/100 L (0,3 - 0,45 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares sobre las hojas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 L/ha.	5
	Trips de California	60 cc/100 L		
	Falsa arañita roja de la vid	30 - 60 cc/100 L (espaldera: 0,21 - 0,42 L/ha parronal: 0,3 - 0,6 L/ha)	Iniciar aplicación con brote expuesto, al observar los primeros ejemplares, de acuerdo a sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días, en caso de alta presión. Moiamiento sugerido: espaldera 700 L/ha, min. y parronal 1.000 L/ha.	
	Burrito de la vid	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, al observar adultos en el follaje. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 400 - 1.500 L/ha, según el estado de desarrollo del cultivo.	
	Chanchito blanco criboso	60 cc/100 L	Aplicar en brotación al aparecer los primeros ejemplares de acuerdo al sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 1.500 L/ha.	
	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	90 cc/100 L	Aplicar vía foliar, de acuerdo con el sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 1 máx. Moiamiento sugerido: 1.000 L/ha.	
	Conchuela café europea	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, con presencia de ninfas migratorias o <i>crawlers</i> en el follaje. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 18 - 21 días. Moiamiento sugerido: • Espaldera: 800 - 1.200 L/ha. • Parronal: 1.500 - 1.000 L/ha.	
	Chanchito blanco de los frutales		Aplicar en postcosecha, según monitoreo, con un moiamiento que permita el escurrimiento. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 28 días máx, según monitoreo. Moiamiento sugerido: • Espaldera: 800 - 1.500 L/ha. • Parronal: 1.800 - 2.500 L/ha.	
	Chanchito blanco de cola larga	60 - 120 cc/100 L	Aplicar en postcosecha, según monitoreo. Usar la dosis mayor, con alta presión de la plaga y para el mayor intervalo de aplicación. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 28 días máx. Moiamiento sugerido: • Espaldera: 800 - 1.500 L/ha. • Parronal: 1.800 - 2.500 L/ha.	
	Taladrador de la vid	60 cc/100 L	Aplicar en postcosecha, según monitoreo. Utilizar un buen moiamiento acorde al desarrollo y sistema de conducción del cultivo. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 20 - 30 días. Moiamiento sugerido: • Espaldera: 200 - 400 L/ha. • Parronal: 500 - 1.000 L/ha.	
Arándano Frambueso Frutilla	Arañita bimaculada Arañita roja europea Burrito de la vid Trips de California Trips negro de las flores	37,5 cc/100 L (0,3 L/ha) 60 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros ejemplares sobre las hojas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 800 L/ha.	1
Arándano	<i>Proeuilia auraria</i>	12 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga. Aplicaciones por temporada: 1. Intervalo entre aplicaciones: 500 - 1.000 L/ha, dependiendo del estado fenológico.	1
Clementino Limonero Mandarino Naranja Pomelo	Falsa arañita roja de la vid	50 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros ejemplares, de acuerdo al sistema de monitoreo. La dosis en L/ha dependerá del estado de desarrollo del cultivo. Para árboles jóvenes de hasta 2,5 m. de altura se recomienda un moiamiento de 2.000 L/ha y para árboles con más de 4 m. de altura o con follaje frondoso se recomienda un moiamiento de 3.500 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 2.000 - 3.500 L/ha.	Clementino, Naranja, Pomelo: 120 Limonero: 75 Mandarino: 150
	Polillas plegadoras (<i>Proeuilia</i> spp.)	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, al detectar los primeros ejemplares sobre los brotes. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 20 - 30 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 3.500 L/ha, según el estado fenológico.	
	<i>Proeuilia auraria</i> Polilla oriental de la fruta	8 - 12 cc/100 L (0,12 - 0,24 L/ha)	Aplicar de acuerdo al sistema de monitoreo de trampas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	Pulgón verde del duraznero	12 - 15 cc/100 L (0,18 - 0,3 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Almendro	Arañita bimaculada	60 cc/100 L	Aplicar cuando la población supere el umbral económico. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: • Huerto en producción: 1.500 - 2.500 L/ha. • Huerto en formación: 500 - 800 L/ha.	7
	Burrito de la vid		Aplicar según monitoreo, al observar presencia del estado adulto, asegurando un buen cubrimiento. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 21 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	<i>Proeuilia auraria</i> Polilla oriental de la fruta	8 - 12 cc/100 L (0,12 - 0,24 L/ha)	Aplicar de acuerdo al sistema de monitoreo de trampas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	4
	Pulgón verde del duraznero	12 - 15 cc/100 L (0,18 - 0,3 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Arañita bimaculada	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, cuando la población supere el umbral económico. Aplicaciones por temporada: 1 máx. Usar volumen menor para huertos en formación y volumen mayor para huertos adultos.	
Manzano Membrellero Peral Peral asiático	Burrito de la vid	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, al observar presencia del estado adulto, asegurando un buen cubrimiento. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 21 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	Manzano, Peral y Peral asiático: 21 Membrellero: 20
	<i>Proeuilia auraria</i> Polilla de la manzana	8 - 12 cc/100 L (0,12 - 0,24 L/ha)	Aplicar de acuerdo al sistema de monitoreo de trampas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	Arañita bimaculada Arañita roja europea	30 cc/100 L (0,45 - 0,6 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares, de acuerdo al sistema de monitoreo. La dosis a utilizar en L/ha, dependerá del estado fenológico de los árboles, a menor desarrollo fenológico utilizar la dosis menor (0,45 L/ha con moiamiento a 1.500 L/ha) y la dosis mayor a mayor desarrollo fenológico de los árboles (0,6 L/ha con un moiamiento de 2.000 L/ha). Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	Arañita bimaculada	30 - 60 cc/100 L	Aplicar cuando la plaga supere el umbral económico, de acuerdo al sistema de monitoreo. Si es necesario, repetir la aplicación en la misma generación de la plaga. Usar la dosis menor solo con presiones bajas de la plaga o en una segunda aplicación de acaricida, en la misma generación. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Moiamiento sugerido: 2.000 - 3.000 L/ha.	
Nogal	Burrito de la vid	60 cc/100 L	Aplicar durante la temporada de emergencia de adultos de burritos de la vid. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: al menos cada 23 días. Moiamiento sugerido: 1.500 a 2.500 L/ha, según el estado de desarrollo del cultivo.	7
	Polilla de la manzana	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo. Realizar una buena distribución del producto. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 18 - 21 días. Moiamiento sugerido: 2.000 L/ha.	
	Pulgón del avellano	15 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. En caso de reinfestaciones se recomienda repetir no antes de 15 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	Burrito del frambueso	30 - 60 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros adultos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días, si fuera necesario. Moiamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Kiwi	Chinche verde Chinche parda	10 cc/100 L	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 1.000 - 2.000 L/ha, dependiendo del estado fenológico y la densidad de la canopia.	103
	<i>Proeuilia auraria</i> <i>Proeuilia chrysoteris</i>	12 cc/100 L	Aplicar después de floración hasta fines de diciembre. Moiamiento sugerido: 700 L/ha.	
Palto	Falsa arañita roja de la vid	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo, a partir de brotación. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 5 a 10 días. Usar el intervalo menor en caso de alta infestación o en épocas de activo crecimiento.	21
	Arañita roja del palto	50 cc/100 L (1,5 - 1,75 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares, de acuerdo al monitoreo. La dosis a utilizar en L/ha dependerá del estado de desarrollo del cultivo. Para un moiamiento de 3.000 L/ha, la dosis debe ser equivalente a 1,5 L/ha y para un moiamiento de 3.500 L/ha, la dosis debe ser equivalente a 1,75 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 3.000 - 3.500 L/ha.	
Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja y Poroto.	Polilla del frejol	17 cc/100 L (0,1 L/ha)	Aplicar de acuerdo a sistema de monitoreo, protegiendo las vainas desde la cuaja, cuando los brotes se vean dañados. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días. Moiamiento sugerido: 600 L/ha.	3
Papa Remolacha	Langostino de la remolacha Pulgón de la haba Pulgón del melón Pulgón negro de la alfalfa Pulgón verde del duraznero Minador de las chacras	12,5 cc/100 L (0,075 L/ha) 21 cc/100 L (0,125 L/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 600 L/ha.	1
	Tomate	Polilla del tomate	17 cc/100 L (0,1 L/ha)	3
Cebolla	Trips de la cebolla	0,3 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. En caso de re-infestaciones se recomienda repetir a los 7 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Moiamiento sugerido: 300 - 600 L/ha.	21
	Brócoli Coliflor Repollo Repollo de Bruselas	Chinche pintada (<i>Bagrada hilaris</i>)	100 - 250 cc/100 L	3
Berro Brócoli Coliflor Kale Repollo Repollo de Bruselas Rúcula	Araña roja	60 cc/100 L	Aplicar según monitoreo de la plaga, al observar los primeros ejemplares, asegurando un buen cubrimiento. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 300 - 600 L/ha.	7
	Brócoli Kale Repollo		Aplicar según monitoreo de la plaga, al observar los primeros ejemplares, asegurando un buen cubrimiento. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Moiamiento sugerido: 300 - 600 L/ha.	
Maíz	Gusano de choclo	120 - 180 cc/ha	Aplicar al inicio de la emisión de estilo.	14
	Arañita bimaculada	200 - 300 cc/ha	Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 300 L/ha.	
Trigo	Gusano cortador Gusano barrenador Gusano alambre	300 cc/ha	Aplicar en pre-siembra incorporada o post-emergencia temprana a la base de la planta. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 300 L/ha.	30
	Pulgón del tallo Pulgón de la espiga Pulgón verde pálido	75 - 125 cc/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares, según monitoreo. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Moiamiento sugerido: 100 - 200 L/ha.	
Empastadas: Ballicas Chépica Pasto miel Pasto dulce Trébol enano Trébol blanco	Cuncunilla negra	100 - 125 cc/ha	Aplicar a la base de las plantas al aparecer los primeros ejemplares. Repetir en caso de nueva detección de la plaga. Aplicaciones por temporada: 2. Moiamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	No corresponde
Ornamentales: Clavel Crisantemo Gladiolo Rosa	Arañita bimaculada Arañita roja europea Falsa arañita roja de la vid Mosquita blanca de los invernaderos	0,2 - 0,3 L/ha 0,3 - 0,5 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Aplicaciones por temporada: 1.	No corresponde
	Trips de California	0,3 L/ha		

Cuadro de instrucciones de uso aéreo:				
Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	<i>Proeuilia auraria</i>	0,3 - 0,45 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Utilizar la dosis menor con baja presión de la plaga y la dosis mayor con una alta presión de la plaga.	5
	Trips de California	0,9 L/ha	Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 60 L/ha.	
Avellano europeo	Falsa arañita roja de la vid	Espaldera: 0,21 - 0,42 L/ha Parronal: 0,3 - 0,6 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. En caso de reinfestaciones se recomienda repetir no antes de 15 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Moiamiento sugerido: 60 L/ha.	7
	Pulgón del avellano	0,3 L/ha	Aplicar al observar los primeros adultos y repetir a los 15 días si fuera necesario. Utilizar la dosis menor con baja presión de la plaga y la dosis mayor con una alta presión de la plaga. Aplicaciones por temporada: 2. Moiamiento sugerido: 60 L/ha.	
	Burrito del frambueso	0,45 - 0,9 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga, de acuerdo al sistema de monitoreo. Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 60 - 100 L/ha, dependiendo del equipo a utilizar.	
Palto	Chinche verde Chinche parda	0,1 - 0,2 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares, de acuerdo al monitoreo. La dosis a utilizar en L/ha dependerá del estado de desarrollo del cultivo. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Moiamiento sugerido: 60 L/ha.	21
	Arañita roja del palto	1,5 - 1,75 L/ha	Aplicar al inicio de la emisión de estilos.	
Maíz	Gusano de choclo	120 - 180 cc/ha	Aplicaciones por temporada: 1.	14
	Arañita bimaculada	200 - 300 cc/ha	Aplicaciones por temporada: 1. Moiamiento sugerido: 60 L/ha.	

*. realizar una buena distribución del producto y utilizar un volumen de aplicación de acuerdo al desarrollo del cultivo. Utilizar la dosis menor con baja presión de la plaga y la dosis mayor con alta presión de la plaga.

Equipo de aplicación: equipos de aspersión o nebulizadores de alto o bajo volumen. Avioneta o helicóptero en aplicaciones aéreas.
Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, agregar **Bifentrin 100 EC** a través del filtro del estanque de aplicación a medio llenar, luego completar el estanque y aplicar. Tanto el llenado del estanque, como la aplicación se deben realizar con el agitador en funcionamiento en forma constante. Se debe preparar la cantidad de producto que se ocupará durante el día, no es conveniente dejar producto preparado de un día para otro.
Precauciones: mantener la dosis por hectárea para el caso de aplicación con equipos de bajo volumen. Se recomienda alternar aplicaciones con otros insecticidas de distinto grupo químico, para no generar poblaciones resistentes o menos sensibles. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo de más de 8 km/hr y no aplicar con altas temperaturas (>28°C).
Fitotoxicidad: no es fitotóxico en las especies recomendadas, si se utiliza de acuerdo a las dosis y dosis indicadas.
Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, excepto aquellos de reacción alcalina. En caso de mezclas no conocidas, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.
Incompatibilidad: no aplicar en mezclas, ni en aplicaciones consecutivas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas, para personas y animales. Previamente, verificar que la aspersión se haya secado sobre la superficie de las especies tratadas.
Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las plagas para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

