

Palabra de advertencia

PELIGRO

**Indicaciones de peligro:**

H314: provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H302: nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia:

P260: no respirar polvos o nieblas. P264: lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P280: usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P270: no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302 + P361 + P354: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. P363: lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P316: buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia. P321: tratamiento específico. P305 + P354 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405: guardar bajo llave. P501: eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.

En caso de intoxicación llamar:

Centro Atención Toxicológica
UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas).

v20052026

FOSFONAT® 40-20

Lote N°:

Fecha fabric./Fecha venc.:

Fertilizante inorgánico compuesto por más de un macronutriente Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	67,2
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅)	60,0
Óxido de potasio (K ₂ O)	30,0

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 0,5
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5
Zinc	< 10

Parámetros físicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,50 g/mL
pH (10% a 20°C)	2,2

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.
agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Fertilizante líquido de uso foliar y vía fertirriego, formulado a base de fosfito de potasio (K₂HPO₃: 685 g/L) que aporta 40% m/m de P₂O₅ y 20% m/m de K₂O. Se absorbe rápidamente por la planta, trasladándose en forma ascendente y descendente. Se caracteriza por aportar nutrientes como fósforo y potasio, estimular el crecimiento radicular y de brotes, aumentar la cuaja y mejorar la calidad de la fruta.

Recomendaciones de uso vía foliar y fertirriego

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones*
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha, con hojas activas.
Manzano, membrillero y peral.		Aplicar desde inicio de brotación. De ser necesario, aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias para el desarrollo de alguna enfermedad y en postcosecha, con hojas activas.
Almendro, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero y nectarino.		Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha, con hojas activas.
Clementino, clemenule, limonero, mandarina, naranjo, pomelo y tangelo.		Aplicar desde inicio de brotación, sobre todo si se presentan condiciones favorables de humedad o agua libre y en postcosecha, con hojas activas.
Arándano, frambueso, frutilla, grosella, mora y zarzaparrilla.	2 - 4	Aplicar desde el inicio de brotación o en cada <i>flash</i> de crecimiento radicular y en postcosecha, con hojas activas.
Kiwi, olivo y palto.	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación, en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha, con hojas activas.
Avellano europeo, castaño, nogal y pistacho.		
Acelga, achicoria, ají, ajo, apio, berenjena, brócoli, bñching, cebolla, chalota, cibollette, coliflor, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, puerro, rábano, repollito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zanahoria, zapallo y zapallo italiano.	1 - 3	En almaciguera, aplicar desde 2 hojas verdaderas y en post-trasplante, aplicar durante desarrollo vegetativo.
Alcachofa		Aplicar post trasplante, formación de cabezuela y desarrollo vegetativo.
Papa	2 - 4	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas y en formación del tubérculo.
Alfalfa, maíz, praderas, raps, remolacha y trigo.	1 - 1,5	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas.

*: aplicaciones por temporada: 4 máx.

*: intervalo entre aplicaciones: si es necesario repetir la aplicación, considerar los siguientes intervalos: vides, pomáceas, carozos, cítricos, berries, alcachofa y papa: 15 a 20 días. Otros frutales: 30 días. Otros cultivos y praderas: 10 a 15 días.

Instrucciones de uso

- Se puede aplicar vía aérea o terrestre, tanto al follaje como al suelo, durante todo el ciclo del cultivo, principalmente en situaciones de estrés.
- Para equipos terrestres, no usar concentraciones superiores a 300 cc/100 L de agua.
- Para equipos electrostáticos y/o aéreos, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- Fosfonat 40-20 es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.
- Evitar aplicar en mezcla con dimetoato, aceites y productos a base de cobre.
- El uso de Fosfonat 40-20 en mezcla con sales insolubles de cobre (ej: hidróxidos de cobre, óxido cuproso, oxiclورو de cobre, caldo bordelés y sales básicas de cobre) puede inducir fitotoxicidad. Además, se recomienda dejar pasar 10 días luego de una aplicación de cobre para aplicar Fosfonat 40-20.

Condiciones de almacenamiento

Conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

® marca registrada de Agrospec S.A