

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: kresoxim metil pertenece al grupo químico de las oximinoacetatos y Tebuconazol al grupo químico de los triazoles.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel. Durante la manipulación usar traje impermeable, máscara con filtro de aire, guantes impermeables, botas de goma y antiparras.

**Equipo de protección personal durante la preparación y aplicación:** usar traje impermeable, máscara con filtro de aire, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni forrajes.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

**Información ecotoxicológica:** a las dosis de aplicación recomendadas, Fungifull 275 SC, es LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, prácticamente no tóxico a aves, moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos, muy ligeramente tóxico para algas y ligeramente tóxico para lombrices.

**Instrucciones para el triple lavado:** realizar triple lavado de los envases, agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.

### Síntomas de intoxicación:

**Inhalación:** puede causar irritación de las vías respiratorias, tos, inflamación de la mucosa de la nariz, sinusitis, dificultad para respirar en personas susceptibles.

**Contacto con la piel:** el contacto prolongado o repetido puede causar irritación y enrojecimiento de la piel.

**Contacto con los ojos:** puede producir lagrimeo y conjuntivitis e irritación en los ojos.

**Ingesta:** producto que normalmente no ofrece peligro. Puede producir náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, vértigo, dolor abdominal, irritación gástrica.

**Antídoto:** no existe antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático.

### Primeros auxilios:

**En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira dar respiración artificial utilizando una máscara plástica para protegerse del envenenamiento. Mantener al afectado temperado y en reposo.

**En caso de contacto ocular:** lavar inmediatamente con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto.

**En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

**En caso de contacto cutáneo:** retirar ropas y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de ser necesario acudir a un médico.

**En todos los casos,** trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Lleve la Etiqueta o el Envase.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

### REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

### LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

### NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

### NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

### NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

### PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

### GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

### EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar:

Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):

56 2 2635 3800 (24 horas)

Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

# FUNGIFULL® 275 SC

## Fungicida Suspensión Concentrada (SC)

**FUNGIFULL 275 SC** es un fungicida de contacto y sistémico, de acción preventiva, curativa y erradicante, recomendado para el control de oídio en vides y manzanos, septoriosis, oídio y roya en trigo, repilo en olivos y roya en ajo y cebolla.

### COMPOSICIÓN:

#### Ingrediente Activo: % p/v

Kresoxim metil*	12,5 % (125 g/L)
Tebuconazol**	15 % (150 g/L)
Coformulantes c.s.p	100 % (1 L)

\* (E)-metoxiimino[a-(o-toliloxi)o-tolil]acetato de metilo.

\*\*(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol

### Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2890

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°

Cont. Neto: L. Venc.:

Fabricado y distribuido por:


Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile

Teléfono: 56 2 2836 8000

San Rafael N° 3820 A.  
Los Andes. Valparaíso, Chile

agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO



NOCIVO

v18062025

## INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:** Fungifull 275 SC es un fungicida de contacto y sistémico, de acción preventiva, curativa y erradicante, recomendado para el control de oídio en vides y manzanos, septoriosis, oídio y roya en trigo, repilo en olivos y roya en ajo y cebolla.

**Equipo de aplicación:** pulverizadora.

**Cuadro de instrucciones de uso terrestre:**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera <i>(Diplodia seriata Phaeomoniella chlamydospora)</i>	200 cc/100 L	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mñ. Mojamiento sugerido: - Parronal: 600 - 800 L/ha. - Espaldera: 300 - 400 L/ha.	No corresponde
	Oídio	65 cc/100 L	Aplicar preventivamente desde brotación en adelante. Aplicaciones por temporada: 3 máx. no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Mojamiento sugerido: 1.200 - 1.800 L/ha, según el estado de desarrollo del cultivo.	14
	Venturia	65 cc/100 L	Aplicar preventivamente desde puntas verdes. Aplicaciones por temporada: 2 máx. no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha, según el estado de desarrollo del cultivo.	10
Manzano	Oídio	100 cc/100 L	Aplicar inmediatamente después de la cosecha o de la poda, si existen condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mñ. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.	No corresponde
	Venturia	50 - 65 cc/100 L	Aplicar preventivamente, cuando existan las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	60
Trigo	Oídio Royas de la hoja Septoriosis de la hoja	1 L/ha	Aplicar preventivamente desde estado de 1er a 2do nudo. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 40 días máx. Mojamiento sugerido: 150 - 200 L/ha.	45
Ajo, Cebolla	Roya <i>(Puccinia allii)</i>	0,5 - 1 L/ha	Aplicar preventivamente, cuando se observen condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha.	Ajo: 7 Cebolla: 3

**Cuadro de instrucciones de uso aéreo:**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera <i>(Diplodia seriata Phaeomoniella chlamydospora)</i>	0,6 a 0,8 L/ha en parronal 0,3 a 0,4 L/ha en espaldera	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mñ. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	No corresponde
	Hongos de la madera <i>(Diplodia seriata)</i>	1,5 a 2 L/ha	Aplicar inmediatamente después de la cosecha o de la poda, si existen condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mñ. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	No corresponde
	Repilo del olivo	0,8 - 1 L/ha	Aplicar preventivamente, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	60
Trigo	Oídio Royas de la hoja Septoriosis de la hoja	1 L/ha	Aplicar preventivamente desde estado de 1er a 2do nudo. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 40 días máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	45

**Preparación de la mezcla:** para cada una de las aplicaciones, agregar Fungifull 275 SC al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar la capacidad del estanque y aplicar.

**Precauciones:** se recomienda realizar aplicaciones alternadas con fungicidas de distinto grupo químico o forma de acción, para evitar la aparición de resistencia por parte del hongo al fungicida. Razas resistentes pueden llegar a ser dominantes en la población del hongo, después del uso repetido de este fungicida, detectándose fallas de control. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (no superior a 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

**Fitotoxicidad:** usado de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta Fungifull 275 SC no es considerado fitotóxico.

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de la aplicación realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala.

**Incompatibilidad:** incompatible con productos de reacción ácida.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 12 horas después de ser aplicado. Para animales no corresponde, ya que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

**Nota del fabricante:** el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

® marca registrada de Agrospec S.A.

