

HUMIFUL® 26 SL

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Bioestimulante no microbiano
Líquido en solución

Composición	% m/v
Extracto húmico de leonardita total	26,0
Ácidos húmicos	20,7
Materia seca (% m/m)	19,3
Carbono (C)	10,2
Ácidos fúlvicos	5,3
Óxido de potasio (K ₂ O)	2,6

Contaminantes	ppm
Arsénico	2
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	2
Zinc	< 10
Escherichia coli	ausente
Salmonella sp.	ausente

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,14 g/mL
pH (10% a 20°C)	7,9

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.
agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Bioestimulante líquido a base de ácidos húmicos (18,1% m/m) y fúlvicos (4,6% m/m) proveniente de leonardita (22,7% m/m), que aporta 17,5% m/m de materia orgánica. Posee una excelente relación de las fracciones húmicas (acción de largo plazo) y fúlvicas (acción a corto plazo). Es altamente soluble en agua y está diseñado para ser aplicado vía riego tecnificado.

El uso continuo de extractos húmicos mejora las condiciones físico-químicas del suelo como la estructura, densidad aparente y capacidad de intercambio catiónico, acondicionando el suelo y facilitando el crecimiento de raíces y la absorción de nutrientes.

Humiful 26 SL es capaz de dejar disponible para las plantas todos los nutrientes presentes en el suelo, optimizando así los resultados de los programas de fertilización.

Recomendaciones de uso vía fertirriego

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	50 - 100 L/ha/temporada	Parcializar la dosis en 2 a 3 riegos por temporada. Aplicar con crecimiento radicular activo. En suelos arenosos, puede ser parcializada en más riegos.
Almendro, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino, nogal, peral y pistacho.		
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.		
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.		
Ajo, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, papa, puerro, remolacha y zanahoria.	15 - 40 L/ha/temporada	Aplicar en 1 a 2 riegos postplantación.
Acelga, achicoria, apio, brócoli, coliflor, espinaca, lechuga, rabanito, rábano, repolito de brúselas, repollo y rúcula.		
Aji, berenjena, melón, pepino, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, trigo y triticales.	20 - 60 L/ha/temporada	Parcializar la dosis en 2 a 3 riegos por temporada. Aplicar con crecimiento radicular activo. En suelos arenosos, puede ser parcializada en más riegos.
Huertos en fomación y viveros.		

*: usar dosis mayores en suelos con bajos contenidos de materia orgánica y/o problemas de compactación.

Instrucciones de uso

• Aplicar en el segundo y tercer tercio de riego, según las condiciones de suelo. En suelos compactados, aplicar desde el segundo tercio. En suelos livianos o ya tratados, aplicar en el último tercio.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

• Es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común a excepción del nitrato de calcio, polifosfatos y productos de pH muy ácido o de reacción ácida. Antes de mezclar los productos, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad.

• No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

Precauciones

• Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

• Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

@ marca registrada de Agrospec S.A.