PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: miclobutanilo pertenece al grupo químico de los triazoles.
No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.
Equipo de protección personal durante la manipulación: usar protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables.
Equipo de protección personal durante la aplicación: usar, traje impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial.
No aplicar en contra del viento. Una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.
No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos.
Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, lejos de fuentes de calor, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información Ecotoxicológica: a las dosis de aplicación recomendadas, **Miclobutanil 240 EC** es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para aves y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS.**

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases, agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.

Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas, cefalea, dolor abdominal.

Antídoto: sin antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:
En caso de contacto cutáneo: retirar ropas y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. De ser necesario, conseguir ayuda médica inmediatamente.
En caso de inhalación: trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar algo por la boca a una persona inconsciente o convulsionando.
En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Lleve la etiqueta o el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENER CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

En caso de intoxicación llamar:
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v06082025

MICLOBUTANIL 240 EC

Fungicida
Concentrado emulsionable (EC)

Miclobutanil 240 EC es un fungicida sistémico, preventivo y curativo, recomendado para el control de enfermedades foliares, de los cultivos citados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo	**% p/v**
Miclobutanilo*	24% p/v (240 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/v (1L)

*(*RS*)-2-*p*-clorofenil-2-(1*H* -1,2,4-triazol-1-ilmetil) hexanonitrilo.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2990

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L. Fecha Venc.:

Fabricado y distribuido por:

agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú,
Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000

San Rafael N°3820 A. Los Andes, Valparaíso, Chile

agrospec.cl

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Miclobutanil 240 EC es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa.
Equipo de aplicación: pulverizador, avión o helicóptero.
Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando **Miclobutanil 240 EC** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar con agua el estanque y aplicar.

Cuadro de instrucciones de uso terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Vides	Oídio *(Uncinula necator)*	10 - 12 cc/100 L	Iniciar las aplicaciones con brote de 5 a 10 cm de largo. Aplicaciones por temporada: 4 máx, rotando con productos de distinto grupo químico. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días. Mojamiento sugerido: 500 - 2.000 L/ha, dependiendo de la forma de conducción y la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación.	10
Olivo	Repilo *(Fusicladium oleagineum)*	12 cc/100 L	Iniciar las aplicaciones desde post-cosecha y hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Aplicar con buen cubrimiento acorde al desarrollo vegetativo del cultivo. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.	70
Pimiento Tomate	Oídio *(Oidium lycorpersici Leveillula taurina Erysiphe cichoracearum)*	120 - 200 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, aumentar las dosis de aplicación a medida que crece el cultivo. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	Pimiento: 3 Tomate: 10
Alcachofa	Oídio *(Leveillula taurina Erysiphe cichoracearum)*			Alcachofa: 3
Remolacha azucarera	Oídio *(Erysiphe polygoni)*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L/ha.	28
Papa	Oídio *(Golovinomyces cichoracearum)*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente desde el momento en que se observen los primeros signos de oídio. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L/ha.	3
Arroz Avena Cebada Centeno Trigo	Oídio *(Blumeria graminis)*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	20
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Oídio *(Golovinomyces cichoracearum)*	130 - 170 cc/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 500 L/ha.	3

Cuadro de instrucciones de uso aéreo:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Olivo	Repilo *(Fusicladium oleagineum)*	240 - 300 cc/ha	Iniciar las aplicaciones desde post-cosecha y hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	70

*: utilizar la dosis menor en caso de menor presión de la enfermedad y la dosis mayor en caso de mayor presión de la enfermedad.

Precauciones: para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), no aplicar con T° mayores a 25°C o alta humedad ambiental.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que se indican.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Si se utiliza en mezcla con otros plaguicidas se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

Incompatibilidad: no aplicar con productos de reacción alcalina o ácida. No mezclar con Caldo Bordolés y Polisulfuro de calcio.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de ser aplicado. Para animales no corresponde, por que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, según las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

CUIDADO