

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de los oximinooacetatos y miclobutanilo pertenece al grupo químico de los triazoles.

No comer, ni beber o fumar durante la aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la manipulación: utilizar overol impermeable, gafas o antiparras, mascarilla, botas y guantes de goma.

Equipo de protección personal durante la aplicación: utilizar overol impermeable, gafas o antiparras, máscara con filtro, botas y guantes de goma.

No aplicar en contra el viento. Una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendadas, **STOPIL 140 SC**, es **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**, practicamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces y lombrices, altamente tóxico para daphnias y algas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases, agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.

Síntomas de intoxicación: puede causar picazón, ardor, comezón y hormigueo. Puede causar irritación ocular mínima y reversible. Además, puede causar incoordinación, temblor, salivación, vómito, diarrea e irritabilidad al sonido y al tacto.

Antídoto: no posee antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira dar respiración artificial utilizando una máscara de respiración artificial.

En caso de contacto cutáneo: retirar ropas y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 - 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Para todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un Centro asistencial. Lleve la etiqueta o el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

En caso de intoxicación llamar:
Centro Información Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v04082025

STOPIL® 140 SC

Fungicida

Suspensión Concentrada (SC)

STOPIL 140 SC es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva, curativa y erradicante, que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del hongo, controlando oídio en vides y repilo en olivo.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo % p/v

Kresoxim-metilo* 10% p/v (100 g/L)
Miclobutanilo** 4% p/v (40 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1L)

* (E)-metoxiimino[α-(o-toliloxi)o-tolil]acetato de metilo

** (RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.900

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L. Fecha Venc.:

Fabricado y distribuido por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: **STOPIL 140 SC** es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva, curativa y erradicante, que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del hongo, controlando oídio en vides y repilo en olivo.

Equipo de aplicación: equipos de aspersión o nebulizadores, avión o helicóptero

Cuadro de instrucciones de uso terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 L)	Observaciones	Carencias (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Oídio	70	Aplicar desde brotación a pinta en un programa preventivo para el control de oídio. Se recomienda no realizar aplicaciones consecutivas y alternar con productos de distinto grupo químico. Según el estado de desarrollo de las plantas, aplicar con un buen mojado para asegurar una adecuada cobertura. Para aplicaciones de bajo volumen, usar un mínimo de 1 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojado sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.	7
Olivo	Repilo	70	Aplicar con condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad en otoño (post-cosecha) y primavera (previo a floración). Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojado sugerido: 1.500 L/ha.	35

Cuadro de instrucciones de uso aéreo:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencias (días)
Olivo	Repilo	1	Aplicar con condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad en otoño (post-cosecha) y primavera (previo a floración). Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojado sugerido: 20 - 60 L/ha.	35

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad, agregar la cantidad requerida de **STOPIL 140 SC** y luego completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante. Se debe preparar la cantidad de producto que se ocupará durante el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para otro.

Precauciones de uso: **STOPIL 140 SC** puede ser utilizado como parte de una estrategia anti-resistencia, debido a que los 2 ingredientes activos que lo componen, pertenecen a diferentes grupos químicos.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico en las especies recomendadas, si se utiliza de acuerdo con la forma y dosis indicadas.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Incompatibilidad: no aplicar en mezclas, ni en aplicaciones consecutivas con productos de reacción alcalina. Evitar mezclas con polisulfuro de calcio o productos cúpricos.

Tiempo de reingreso al área tratada: para personas 24 horas, después de ser aplicado. Para animales no corresponde, ya que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

© marca registrada de Agrospec S.A.

