

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.

Sulfur 80% WG es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la manipulación: usar delantal impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial.

Equipo de protección personal durante la aplicación: usar traje impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial.

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Conserve el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. No almacenar junto con alimentos, forrajes ni semillas.

Información Ecotoxicológica: a las dosis de aplicación recomendadas, **Sulfur 80% WG** es considerado prácticamente no tóxico para aves, levemente tóxico para peces y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**.

Síntomas de intoxicación: en caso de contacto prolongado, se produce conjuntivitis e irritación cutánea, bronquitis con expectoraciones.

Antídoto: no es un producto tóxico. Sin antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: tratamiento sintomático, base.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto cutáneo: lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. De ser necesario, conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca administrar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Consequir ayuda médica inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

En caso de intoxicación llamar :
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

16092025

SULFUR 80% WG

Fungicida
Granulado Dispersable (WG)

Sulfur 80% WG, es un fungicida preventivo de contacto destinado al control de oídio en uva de mesa y vid vinífera, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, remolacha, y los cultivos y enfermedades citadas en el Cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo:	% p/p
Azufre	80% p/p (800 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/p (1 kg)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2457-O

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y distribuido por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO			
Descripción: Sulfur 80% WG es un fungicida preventivo, posee una inmejorable formulación, por lo que se logra un alto grado de humectación, homogenización y dispersión del ingrediente activo y con una prolongada permanencia en el tiempo en la superficie aplicada. Controla oidio en la forma preventiva en duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, uva de mesa y vid vinífera, remolacha azucarera y hortalizas.			
Equipo de aplicación: pulverizador, Nebulizador o Bomba de espalda. Al usar nebulizadoras de bajo volumen se deben aplicar las dosis más altas, de modo de aplicar correctamente la dosis por hectárea sugerida. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo o alta humedad ambiente.			
Cuadro de instrucciones de uso: AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA			
Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Vid	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	200 - 300 g/ 100 L	Aplicar de forma preventiva. Iniciar con brotes de 10 -15 cm de largo. Intervalo entre aplicaciones: 8 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha. En post-cosecha, previo a la caída de las hojas, de ser necesario realizar: 1 o 2 aplicaciones. Aplicaciones por temporada: 10. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.
Ciruelo Duraznero Nectarino	Oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) Roya, Polvillo (<i>Tranzchelia discolor</i>)	300 - 400 g/ 100 L 250 - 300 g/ 100 L	En duraznero y nectarino, aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15, si fuera necesario. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.
Manzano	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	Pre-floración: 400 - 600 g/ 100 L Post-floración: 200 - 300 g/ 100 L	Primera aplicación en caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.
Melón, Pepino, Sandía, Zapallo y zapallo italiano	Oidio, peste ceniza (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 14 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha.
Alcachofa Arveja Frejol Papa Tomate	Oidio, peste ceniza (<i>Golovinomyces cichoracearum</i> y <i>Leveillula taurica</i>) Oidio (<i>Erysiphe poligony</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha. Para arveja y frejol: Aplicaciones por temporada: 2
Frambueso	Oidio (<i>Podosphaera macularis</i>)	250 - 350 g/ 100 L	Aplicar desde la aparición de los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha de acuerdo a la densidad del follaje.
Plantas ornamentales	Oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 200 L/ha.
Remolacha azucarera	Oidio (<i>Erysiphe poligony</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.

