

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: tebuconazol pertenece al grupo químico de los triazoles.
No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la manipulación: utilizar protector facial, delantal impermeable de PVC, botas de goma y guantes impermeables.

Equipo de protección personal durante la aplicación: utilizar protector facial, overol impermeable de PVC, botas de goma y guantes impermeables.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos.

Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información Ecotoxicológica: a las dosis de aplicación recomendadas, **Tebuconazol 25% WP** es **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**, prácticamente no tóxico para aves y moderadamente tóxico para peces.

Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: no posee antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

En caso de contacto con cutáneo: retirar las ropas y zapatos contaminados. Lavar la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos con abundante agua de la llave. En caso de ser necesario, acuda a un especialista.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. De ser necesario, conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de ingestión: **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

En caso de intoxicación llamar :
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v27102025

TEBUCONAZOL 25% WP

Fungicida
Polvo Mojable (WP)

Tebuconazol 25% WP es un fungicida sistémico de acción protectora, recomendado para el control de las enfermedades descritas y en los cultivos mencionados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	% p/p
Tebuconazol*	25% p/p (250 g/kg)
Cofulantes, c.s.p.	100% p/p (1 kg)

*(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Autorización del Servicio Agrícola
y Ganadero N° 2655

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado, importado y distribuido por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000

San Rafael N°3820 A. Los Andes. Valparaíso, Chile

agrospec.cl

Fabricado por:

Trustchem Co., Ltd.
D2, 23RD Floor, Golden Eagle International Plaza,
89 Hanzhong Road, 210029, Nanjing, China

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N°8 Lengjing street,
Ningbo 315010, Zhejiang, RP. China.

INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de aplicación: pulverizador.

Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, agregar **Tebuconazol 25% WP** al estanque de aplicación a medio llenar con el agitador en funcionamiento, luego completar con agua la capacidad del estanque y aplicar inmediatamente.

Cuadro de instrucciones de uso terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	125 g /100 L	Aplicar a inicio de flor, repetir en plena flor, y cuando se presenten condiciones ambientales favorables. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Repita en caso de lluvias una vez seca la superficie. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	15
	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	25 g /100 L	Aplicar preventivamente entre brotación y finales de floración. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
	Hongos de la madera (<i>Diplodia seriata</i>) <i>Phaeomoniella</i> <i>chlamydospora</i>)	250 g /100 L	Aplicar inmediatamente después de la poda y/o cuando existan heridas o condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: - Espaldera: 300 - 400 L/ha. - Parronal: 600 - 800 L/ha.	No corresponde
Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	40 - 60 g /100 L	Aplicar con fruto recién cuajado (caída de la chaqueta) hasta endurecimiento de carozo de aplicaciones: 15 días, si fuera necesario. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	5
	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 - 100 g /100 L	Aplicar en botón rosado o plena flor y 1 a 2 semanas antes de cosechar. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Cerezo Guindo	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	53 - 70 g /100 L	Aplicar en botón y plena floración. Utilizar la dosis mayor en condiciones ambientales más favorables al desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 12 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	5
		120 g /100 L	Aplicar en precosecha, para el control preventivo de la enfermedad durante la postcosecha. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Manzano Peral	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 g /100 L	Aplicar desde botón rosado hasta caída de pétalos. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	Manzano: 30 Peral: 21
	Venturia (<i>Venturia inaequalis</i>) <i>Venturia pyrina</i>)	40 g /100 L	Aplicar desde puntas verdes, hasta término de época lluviosa. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 8 - 10 días. Puede ser aplicado hasta 96 horas después de iniciadas las condiciones para la infección. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Manzano	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Moho azul (<i>Penicillium expansum</i>)	120 g /100 L	Aplicar preventivamente en inicio de flor y repetir en caída de pétalos o 7 días después de la primera aplicación. En caso de condiciones predisponentes (lluvia) y/o floraciones prolongadas, se recomienda realizar una nueva aplicación. Mantener estrategia preventiva considerando fungicidas de diferentes modos de acción. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	45
Arándano Frambueso Fruilla Mora	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 - 100 g /100 L	Aplicar preventivamente, o tan pronto como observe los primeros signos y/o condiciones favorables de infección. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 8 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha máx.	30
Tomate	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	50 - 70 g /100 L	Aplicar bajo condiciones favorables y repetir mientras estas persistan. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 8 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha máx.	14
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 - 100 g /100 L		
Ajo Cebolla	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 - 1,0 kg/ha	Aplicar preventivamente al observar los primeros signos, repetir de ser necesario, según condiciones predisponentes. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 8 - 10 días.	14
Cebada Trigo	Septoriosis (<i>Mycosphaerella graminicola</i>) Helminthosporiosis (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>) Mancha ocular (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>) Royas (<i>Puccinia graminis</i> <i>Puccinia glumarum</i>)	0,5 - 1 kg/ha	Aplicar al momento de observar los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Mojamiento sugerido: 200 L/ha	35
Rosas Flores	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Royas (<i>Puccinia crysanthemi</i> <i>Uromyces dianthi</i>)	40 - 80 g /100 L	Aplicar al observar los primeros signos y/o síntomas de estas enfermedades. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha	No corresponde

Utilizar siempre las dosis menores recomendadas, y en condiciones de alta presión de enfermedad, utilizar dosis mayores.

Precaución: realizar un máximo de 2 aplicaciones en la temporada. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

Incompatibilidad: evitar aplicar en mezcla o consecutivamente con productos de reacción alcalina.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de ser aplicado. Para animales no corresponde, por que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

CUIDADO

