



NOMBRE COMUN	Citrus SL
INGREDIENTE ACTIVO	Extractos vegetales
GRUPO QUIMICO	Ácidos orgánicos
FORMULACION	Concentrado Soluble (SL)
COMPOSICION	Extracto de cítricos 75% p/v (750 g/L) Coformulantes c.s.p. 100%p/v (1 L) *equivalente a 7,08 % p/v (70,8 g/L) de ácido L-ascórbico.
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo.
TOXICIDAD	Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro.
AUTORIZACION SAG	2759-O Autorizado para agricultura orgánica.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Citrus SL es un fungicida formulado en base a extractos vegetales. Actúa por con contacto y se recomienda para el control preventivo y curativo de botritis en arándanos y vides, así como botritis y otras enfermedades en hortalizas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Botritis o Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida complejo de microorganismos Bacterias: <i>Acetobacter</i> Hongos: <i>Aspergillus</i> sp. <i>Penicillium expansum</i> <i>Rhizopus</i> sp. <i>Cladosporium herbarum</i>	150 - 180 cc/ 100 L	Aplicar en floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.	0
	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	180 cc/100 L	Aplicar desde el inicio de floración, de acuerdo con las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y la presión natural del patógeno. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: <ul style="list-style-type: none"> • Espaldera: 400 - 1.000 L/ha. • Parronal: 1.000 - 1.800 L/ha. 	
Arándano Frambueso Frutilla Mora Zarzaparrilla	Tizón de la flor, Botritis o Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 - 180 cc/ 100 L	Aplicar al inicio, 50% y al final de la floración o al observar condiciones favorables para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 400 - 600 L/ha.	
Ajo Cebolla Espárrago Lechuga Pimentón Tomate	Botritis o Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Esclerotiniosis (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Pudrición blanda (<i>Erwinia carotovora</i>)	150 - 180 cc/ 100 L	Aplicar preventivamente, según condiciones favorables para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 8 a 12 días. Mojamiento sugerido: 400 - 600 L/ha.	

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencias (días)
Repollo	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 - 1,5 L/ha	Aplicar preventivamente, cuando se observen condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha.	0

CARENCIAS

Citrus SL está exento de carencias.

PRECAUCIONES

- Realizar las aplicaciones de **Citrus SL** en un programa de control de enfermedades. La frecuencia y n° de aplicaciones dependerá de la variedad, presión de la enfermedad y condiciones climáticas para su desarrollo.
- Para aplicaciones de precosecha, emplear el mojamiento recomendados para evitar depósitos en la fruta.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas “**VIRTUALMENTE NO TÓXICO**”.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado de acuerdo con las recomendaciones ya señaladas.

INCOMPATIBILIDAD

- No mezclar con productos alcalino ni agentes oxidantes.
- Soluciones ácidas descomponen el producto.

TIEMPO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación.