



|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMUN       | Citrus SL                                                                                                                                  |
| INGREDIENTE ACTIVO | Extractos vegetales                                                                                                                        |
| GRUPO QUIMICO      | Ácidos orgánicos                                                                                                                           |
| FORMULACION        | Concentrado Soluble (SL)                                                                                                                   |
| COMPOSICION        | Extracto de cítricos 75% p/v (750 g/L)<br>Coformulantes c.s.p. 100%p/v (1 L)<br>*equivalente a 7,08 % p/v (70,8 g/L) de ácido L-ascórbico. |
| MODO DE ACCION     | Contacto, preventivo.                                                                                                                      |
| TOXICIDAD          | Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro.                                                                                      |
| AUTORIZACION SAG   | 2759-O<br>Autorizado para agricultura orgánica.                                                                                            |

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Citrus SL** es un fungicida formulado en base a extractos vegetales. Actúa por con contacto y se recomienda para el control preventivo y curativo de botritis en arándanos y vides, así como botritis y otras enfermedades en hortalizas.

RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo                                                      | Enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                    | Dosis                  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carencia (días) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vid de mesa<br>Vid pisquera<br>Vid vinífera                  | Botritis o Pudrición gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Pudrición ácida complejo de microorganismos<br>Bacterias: <i>Acetobacter</i><br>Hongos: <i>Aspergillus</i> sp.<br><i>Penicillium expansum</i><br><i>Rhizopus</i> sp.<br><i>Cladosporium herbarum</i> | 150 - 180 cc/<br>100 L | Aplicar en floración.<br>Aplicaciones por temporada: 2 máx.<br>Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días.<br>Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.                                                                                                                                                                                                                                   | 0               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Aplicar desde pinta a cosecha con máquina electroestática.<br>Aplicaciones por temporada: 3 máx.<br>Intervalo entre aplicaciones: 10 días.<br>Mojamiento sugerido: 60 - 70 L/ha.                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                                              | Oídio ( <i>Uncinula necator</i> )                                                                                                                                                                                                                             | 180 cc/100 L           | Aplicar desde el inicio de floración, de acuerdo con las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y la presión natural del patógeno.<br>Aplicaciones por temporada: 3 máx.<br>Intervalo entre aplicaciones: 7 días.<br>Mojamiento sugerido: <ul style="list-style-type: none"><li>• Espaldera: 400 - 1.000 L/ha.</li><li>• Parronal: 1.000 - 1.800 L/ha.</li></ul> |                 |
| Arándano<br>Frambueso<br>Frutilla<br>Mora<br>Zarzaparrilla   | Tizón de la flor, Botritis o Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                            | 150 - 180 cc/<br>100 L | Aplicar al inicio, 50% y al final de la floración o al observar condiciones favorables para la enfermedad.<br>Aplicaciones por temporada: 3 máx.<br>Mojamiento sugerido: 400 - 600 L/ha.                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Ajo<br>Cebolla<br>Espárrago<br>Lechuga<br>Pimiento<br>Tomate | Botritis o Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Esclerotiniosis ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )<br>Pudrición blanda ( <i>Erwinia carotovora</i> )                                                                                                     | 150 - 180 cc/<br>100 L | Aplicar preventivamente, según condiciones favorables para la enfermedad.<br>Aplicaciones por temporada: 3 máx.<br>Intervalo entre aplicaciones: 8 a 12 días.<br>Mojamiento sugerido: 400 - 600 L/ha.                                                                                                                                                                                    |                 |

| Cultivo | Enfermedad                              | Dosis        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                            | Carencias (días) |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Repollo | Botritis<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1 - 1,5 L/ha | Aplicar preventivamente, cuando se observen condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas.<br>Aplicaciones por temporada: 2 máx.<br>Intervalo entre aplicaciones: 10 días.<br>Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha. | 0                |

CARENCIAS

Citrus SL está exento de carencias.

PRECAUCIONES

- Realizar las aplicaciones de Citrus SL en un programa de control de enfermedades. La frecuencia y nº de aplicaciones dependerá de la variedad, presión de la enfermedad y condiciones climáticas para su desarrollo.
- Para aplicaciones de precosecha, emplear el mojamiento recomendados para evitar depósitos en la fruta.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado de acuerdo con las recomendaciones ya señaladas.

INCOMPATIBILIDAD

- No mezclar con productos alcalino ni agentes oxidantes.
- Soluciones ácidas descomponen el producto.

TIEMPO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación.