



NOMBRE COMUN	Clorotalonil 500 SC
INGREDIENTE ACTIVO	Clorotalonil
GRUPO QUIMICO	Cloronitrilos
FORMULACION	Suspensión Concentrada (SC)
COMPOSICION	Clorotalonil Coformulantes c.s.p. 50% p/v (500 g/L) 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo
TOXICIDAD	Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro.
AUTORIZACION SAG	2771

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Clorotalonil 500 SC es un fungicida con acción de contacto, recomendado para el control preventivo de una amplia gama de enfermedades en vides, carozos, berries, papa, tomate y diversas hortalizas.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencia (días)
Vides	Antracnosis Botritis Fomopsis	250 - 380 cc/ 100 L	Aplicar desde brotación hasta floración, especialmente con condiciones favorables (humedad o lluvias). Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Vid de mesa: 21
Duraznero Nectarino	Cloca	180 cc/100 L	Aplicar desde botón rosado. Repetir en plena flor, si fuera necesario. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Duraznero: 21 Nectarino: 20
Almendo Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Cloca Corineo Monilia	180 - 200 cc/ 100 L	Aplicar desde inicio de flor. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días, si fuera necesario. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Almendo: 18 Cerezo, Ciruelo, Nectarino: 20 Damasco, Duraznero: 21
Arándano Frambueso Frutilla Mora Zarzaparrilla	Antracnosis Botritis Fomopsis Septoriosis Tizón de la hoja	300 cc/100 L	Aplicar preventivamente desde brotación hasta la floración. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 800 L/ha.	Arándano, Zarzaparrilla: 35 Frambueso, Mora: 28 Frutilla: 10
Papa Tomate	Botritis Tizón tardío Tizón temprano	2,5 - 3,5 L/ha	Aplicar preventivamente. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 200 L/ha.	Papa: 6 Tomate: 1
Ajo Cebolla	Botritis Mildió	2 - 5 L/ha	Iniciar las aplicaciones con plantas de 10 cm de altura. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 150 L/ha.	15
Viveros: Pino Eucalipto	Botritis	2,5 - 4,5 L/ha	Iniciar las aplicaciones con plantas de 10 cm de altura. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 150 L/ha.	No corresponde

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencia (días)
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Alternaria Antracnosis Esclerotinia Oídio	2,5 - 4 L/ha	Aplicar con buen mojado y cubrimiento. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Mojamiento sugerido: 400 - 800 L/ha.	1
Avena Cebada Trigo	Cercosporiosis Helmintosporiosis Septoriosis Rincosporiosis	2 - 3 L/ha	Aplicar cuando se presenten condiciones predisponentes para las enfermedades. Aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento sugerido: 100 - 200 L/ha.	37
Brócoli Coliflor Repollo	Alternaria Cercospora Mildiu	2,5 L/ha	Aplicar luego del trasplante. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 300 - 600 L/ha.	1
Apio	Cercosporiosis Septoriosis	1,7 - 2,5 L/ha	Aplicar después del trasplante. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	7
	Rhizoctonia	3,5 - 5 L/ha		

* Utilizar la dosis mayor en presencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencia (días)
Avena Cebada Trigo	Cercosporiosis Helmintosporiosis Septoriosis Rincosporiosis	2 - 3 L/ha	Aplicar cuando se presenten condiciones favorables para las enfermedades. Aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento sugerido: 10 - 60 L/ha, según equipo a utilizar.	37
Brócoli Coliflor Repollo	Alternaria Cercospora Mildiu	2,5 L/ha	Aplicar luego del trasplante. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días, si fuera necesario. Mojamiento sugerido: 10 - 60 L/ha, según equipo a utilizar.	1
Apio	Cercosporiosis Septoriosis	1,7 - 2,5 L/ha	Aplicar después del trasplante. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 10 - 60 L/ha, según equipo a utilizar.	7
	Rhizoctonia	3,5 - 5 L/ha		

* Utilizar la dosis mayor en presencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PRECAUCIONES

- Utilizar el producto como parte de un programa de manejo integrado de plagas, en rotación con otros fungicidas de distinto modo de acción.
- No aplicar con viento excesivo (> a 8 km/hora) ni con temperaturas mayores a 25°C, ni con alta humedad ambiental.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“VIRTUALMENTE NO TÓXICO”**.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se utiliza a las dosis recomendadas.
- En vides, no aplicar en post-floración ya que podría generar russet.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de mezclas no conocidas, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

INCOMPATIBILIDAD

- No mezclar con productos de reacción alcalina.
- No mezclar con emulsiones, aceites, surfactantes o fertilizantes foliares.
- Esperar 10 días después de una aplicación de aceite.

TIEMPO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.