



NOMBRE COMUN	Fosfonat® 40-20						
INGREDIENTE ACTIVO	Fosfito de potasio (K_2HPO_3)						
FORMULACION	Líquido en solución						
COMPOSICION	<table> <tr> <td></td><td>% m/v</td></tr> <tr> <td>Pentóxido de fósforo (P_2O_5)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Óxido de potasio (K_2O)</td><td>30</td></tr> </table>		% m/v	Pentóxido de fósforo (P_2O_5)	60	Óxido de potasio (K_2O)	30
	% m/v						
Pentóxido de fósforo (P_2O_5)	60						
Óxido de potasio (K_2O)	30						

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fosfonat 40-20 es un fertilizante líquido de uso foliar y vía fertirriego, formulado a base de fosfito de potasio (K_2HPO_3 : 685 g/L). que aporta 40% m/m de P_2O_5 y 20% m/m de K_2O . Se absorbe rápidamente por la planta, traslocándose en forma ascendente y descendente.

Se caracteriza por aportar nutrientes como fósforo y potasio, estimular el crecimiento radicular y de brotes, aumentar la cuaja y mejorar la calidad de la fruta.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar y fertirriego

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera	3 - 5 L/ha	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha (con hojas activas).
Manzano, membrillero y peral.		Aplicar desde inicio de brotación. De ser necesario, aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias para el desarrollo de alguna enfermedad y en postcosecha (con hojas activas).
Almendro, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero y nectarino.		Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha (con hojas activas).

Cultivo	Dosis	Observaciones
Clementino, clemenule limonero, mandarino, naranjo, pomelo y tangelo.	3 - 5 L/ha	Aplicar desde inicio de brotación, sobre todo si se presentan condiciones favorables de humedad o agua libre y en postcosecha (con hojas activas).
Arándano, frambueso frutilla, grosella, mora y zarzaparrilla.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde el inicio de brotación o en cada <i>flash</i> de crecimiento radicular y en postcosecha (con hojas activas).
Kiwi, olivo y palto	3 - 5 L/ha	Aplicar al inicio de brotación, en cada inicio de <i>flash</i> radicular y en postcosecha (con hojas activas).
Avellano europeo, castaño, nogal y pistacho.		
Acelga, achicoria, ají, ajo, apio, berenjena, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga melón, pepino, pimentón, puerro rábano, repollito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zanahoria, zapallo y zapallo italiano.	1 - 3 L/ha	En almaciguera, aplicar desde 2 hojas verdaderas y en postrasplante, aplicar durante desarrollo vegetativo.
Alcachofa	1 - 3 L/ha	Aplicar en post trasplante, formación de cabezuela y desarrollo vegetativo.
Papa	2 - 4 L/ha	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas y en formación de fruto.
Alfalfa, maíz, praderas, raps, remolacha y trigo.	1 - 1,5 L/ha	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas.

Aplicaciones por temporada: 4 máx.

Intervalo entre aplicaciones. Si fuera necesario repetir la aplicación, considerar los siguientes intervalos: vides, pomáceas, carozos, cítricos, berries, alcachofa y papa: 15 a 20 días. Otros frutales: 30 días. Otros cultivos y praderas: 10 a 15 días.

INSTRUCCIONES DE USO

- Se puede aplicar vía aérea o terrestre, tanto al follaje como al suelo, durante todo el ciclo del cultivo, principalmente en situaciones de estrés.
- Para equipos terrestres, no usar concentraciones superiores a 300 cc/100 L.de agua.
- Para equipos electroestáticos o aéreos, consultar a nuestro Depto. Técnico.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.
- No aplicar en mezcla con dimetoato, aceites y productos en base a cobre.
- Su uso en mezcla con sales insolubles de cobre puede inducir fitotoxicidad. Se recomienda dejar pasar 10 días luego de una aplicación de cobre para aplicar **Fosfonat 40-20**.

® marca registrada de Agrospec S.A.