



NOMBRE COMUN	Fungifull® 275 SC		
INGREDIENTE ACTIVO	Kresoxim metil + Tebuconazol		
GRUPO QUIMICO	Oximinoacetatos + Triazoles		
FORMULACION	Suspensión Concentrada (SC)		
COMPOSICION	Kresoxim metil	12,5%	p/v (125 g/L)
	Tebuconazol	15,0%	p/v (150 g/L)
	Coformulantes c.s.p.	100%	p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Contacto y sistémico. Preventivo, curativo y erradicante.		
TOXICIDAD	Grupo II, producto moderadamente peligroso.		
AUTORIZACION SAG	2890		

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fungifull 275 SC es un fungicida de contacto y sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Se recomienda para el control preventivo de óidio en vides y manzanos, septoriosis, óidio y roya en trigo, repilo en olivos y roya en ajo y cebolla.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera (<i>Diplodia seriata</i> <i>Phaeomoniella chlamydospora</i>)	200 cc/100 L	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: - Espaldera: 300 - 400 L/ha. - Parronal: 600 - 800 L/ha.	No corresponde
	Oídio	65 cc/100 L	Aplicar preventivamente, desde brotación en adelante. Aplicaciones por temporada: 3 máx., no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días. Mojamiento sugerido: 1.200 - 1.800 L/ha, según desarrollo del cultivo.	14
Manzano	Oídio	65 cc/100 L	Aplicar preventivamente, desde puntas verdes. Aplicaciones por temporada: 2 máx., no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha, según desarrollo del cultivo.	10
	Venturia		Aplicar preventivamente desde puntas verdes hasta fruto pequeño (7 - 10 mm) y luego, cuando existan condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: se sugiere 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	
Nogal	Hongos de la madera (<i>Diplodia mutila</i>)	100 cc/100 L	Aplicar inmediatamente después de la cosecha, de la poda o si existen condiciones predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.	No corresponde
Olivo	Repilo del olivo	50 - 65 c/100 L	Aplicar preventivamente, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	60

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Trigo	Oídio Roya de la hoja Septorios de la hoja	1 L/ha	Aplicar preventivamente, desde 1 ^{er} a 2 ^{do} nudo. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 40 días máx. Mojamiento sugerido: 150 - 200 L/ha.	45
Ajo Cebolla	Roya <i>(Puccinia alli)</i>	0,5 - 1 L/ha	Aplicar preventivamente, cuando se observen condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha.	Ajo: 7 Cebolla: 3

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera <i>(Diplodia seriata Phaeomoniella chlamydospora)</i>	parronal: 0,6 - 0,8 espaldera: 0,3 - 0,4	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	No corresponde
Nogal	Hongos de la madera <i>(Diplodia mutila)</i>	1,5 a 2	Aplicar inmediatamente después de la cosecha o de la poda, si existen condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	No corresponde
Olivo	Repilo del olivo	0,8 - 1	Aplicar preventivamente, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	60
Trigo	Septorios Roya Oídio	1	Aplicar preventivamente, desde 1 ^{er} a 2 ^{do} nudo. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 40 días máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	45

PRECAUCIONES

- Realizar aplicaciones alternadas con fungicidas de distinto grupo químico o modo de acción, para evitar la aparición de resistencia por parte del hongo al fungicida.
- No aplicar con viento superior a 8 km/hora ni con temperaturas mayores a 28°C.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“LIGERAMENTE TÓXICO”**.

FITOTOXICIDAD

No es considerado fitotóxico, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de aplicar, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

INCOMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción ácida.

TIEMPO DE REINGRESO

12 horas después de realizada la aplicación.

® marca registrada de Agrospec S.A.