



NOMBRE COMUN	Fungifull 275 SC
INGREDIENTE ACTIVO	Kresoxim metil + Tebuconazol
GRUPO QUIMICO	Oximinoacetatos + Triazoles
FORMULACION	Suspensión Concentrada (SC)
COMPOSICION	Kresoxim metil 12,5% p/v (125 g/L) Tebuconazol 15,0% p/v (150 g/L) Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Contacto y sistémico. Preventivo, curativo y erradicante.
TOXICIDAD	Grupo II, producto moderadamente peligroso.
AUTORIZACION SAG	2890

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fungifull 275 SC es un fungicida de contacto y sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Se recomienda para el control preventivo de oídio en vides y manzanos, septoriosis, oídio y roya en trigo, repilo en olivos y roya en ajo y cebolla.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 L de agua)	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera (<i>Diplodia seriata</i> <i>Phaeomoniella chlamydospora</i>)	200	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: Parronal: 600 - 800 L/ha. - Espaldera: 300 - 400 L/ha.	NC
	Oídio	65	Aplicar preventivamente, desde brotación en adelante. Aplicaciones por temporada: 3 máx., no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días. Mojamiento: 1.200 - 1.800 L/ha, según desarrollo del cultivo.	14
Manzano	Oídio	65	Aplicar preventivamente, desde puntas verdes. Aplicaciones por temporada: 2 máx., no consecutivas. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 12 días. Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha, según desarrollo del cultivo.	10
	Venturia		Aplicar preventivamente cada 7 días, desde puntas verdes hasta fruto pequeño (7 - 10 mm) y luego, cuando existan condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	
Nogal	Hongos de la madera	100	Aplicar inmediatamente después de la cosecha, de la poda o si existen condiciones predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.	NC
Olivo	Repilo del olivo	50 - 65	Aplicar preventivamente, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento: 1.500 L/ha.	60

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 L de agua)	Observaciones	Carencia (días)
Trigo	Oídio Roya de la hoja Septorios de la hoja	1 L/ha	Aplicar preventivamente, desde 1 ^{er} a 2 ^{do} nudo. Intervalo de aplicación: 40 días máx. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento: 150 - 200 L/ha.	45
Ajo Cebolla	Roya	0,5 - 1 L/ha	Aplicar preventivamente, cuando se observen condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha.	Ajo: 7 Cebolla: 3

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Hongos de la madera (<i>Diplodia seriata</i> <i>Phaeomoniella chlamydospora</i>)	parronal: 0,6 - 0,8 espaldera: 0,3 - 0,4	Aplicar inmediatamente después de la poda. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	NC
Nogal	Hongos de la madera (<i>Diplodia mutila</i>)	1,5 a 2	Aplicar inmediatamente después de la cosecha o de la poda, si existen condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días mín. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	NC
Olivo	Repilo	0,8 - 1	Aplicar preventivamente, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, desde postcosecha hasta previo a floración. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	60
Trigo	Septorios Roya Oídio	1	Aplicar preventivamente, desde 1 ^{er} a 2 ^{do} nudo. Intervalo entre aplicaciones: 40 días máx. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	45

PRECAUCIONES

- Realizar aplicaciones alternadas con fungicidas de distinto grupo químico o modo de acción, para evitar la aparición de resistencia por parte del hongo al fungicida.
- No aplicar con viento superior a 8 km/hora ni con temperaturas mayores a 28°C.

FITOTOXICIDAD

No es considerado fitotóxico, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de aplicar, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

INCOMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción ácida.

TIEMPO DE REINGRESO

12 horas después de realizada la aplicación.