



NOMBRE COMUN	Humiful® 26 SL	
INGREDIENTE ACTIVO	Extracto húmico de leonardita + ácidos húmicos + carbono + ácidos fúlvicos + óxido de potasio.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION		% m/v
	Extracto húmico de leonardita	26,0
	Ácidos húmicos	20,7
	Carbono (C)	10,2
	Ácidos fúlvicos	5,3
	Óxido de potasio (K ₂ O)	2,6

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Humiful 26 SL es un bioestimulante líquido, a base de ácidos húmicos (18,1% m/m) y fúlvicos (4,6% m/m) proveniente de leonardita (22,7% m/m), que aporta 17,5% m/m de materia orgánica. Tiene una excelente relación de las fracciones húmicas (acción de largo plazo) y fúlvicas (acción a corto plazo), es altamente soluble en agua y está diseñado para ser aplicado vía riego tecnificado.

El uso continuo de extractos húmicos mejora las condiciones físico-químicas del suelo como la estructura, densidad aparente y capacidad de intercambio catiónico, acondicionando el suelo y facilitando el crecimiento de raíces y la absorción de nutrientes. Deja disponible para las plantas todos los nutrientes presentes en el suelo, optimizando así los resultados de los programas de fertilización.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía fertirriego

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y Vid vinífera	50 - 100 L/ha/temporada	Parcializar la dosis en 2 a 3 riegos por temporada. Aplicar con crecimiento radicular activo. En suelos arenosos, puede ser parcializada en más riegos.
Almendro, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino, nogal, peral y pistacho.		

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	50 - 100 L/ha/temporada	Parcializar la dosis en 2 a 3 riegos por temporada. Aplicar con crecimiento radicular activo. En suelos arenosos, puede ser parcializada en más riegos.
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.		
Ajo, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, papa, puerro, remolacha y zanahoria.	15 - 40 L/ha/temporada	Aplicar en 1 a 2 riegos post plantación.
Acelga, achicoria, apio, brócoli, coliflor, espinaca, lechuga, rabanito, rábano, repollito de bruselas, repollo y rúcula.		
Ají, berenjena, melón, pepino, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, trigo y triticale.		
Huertos en formación y viveros.	20 - 60 L/ha/temporada	Parcializar la dosis en 2 a 3 riegos por temporada. Aplicar con crecimiento radicular activo. En suelos arenosos, puede ser parcializada en más riegos.

*: usar la dosis mayor en suelos con bajos contenidos de materia orgánica y/o problemas de compactación.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar en el segundo y tercer tercio de riego, según las condiciones de suelo. En suelos compactados, aplicar desde el segundo tercio. En suelos livianos o ya tratados, aplicar en el último tercio.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- Es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común a excepción del nitrato de calcio, polifosfatos y productos de pH muy ácido o de reacción ácida. Antes de mezclar los productos, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

® marca registrada de Agrospec S.A.