



NOMBRE COMUN	Imidacloprid 70% WS		
INGREDIENTE ACTIVO	Imidacloprid		
GRUPO QUIMICO	Neonicotinoides		
FORMULACION	Polvo Dispersable (WS)		
COMPOSICION	Imidacloprid	70%	p/p (700 g/kg)
	Coformulantes c.s.p.	100%	p/p (1 kg)
MODO DE ACCION	Contacto e ingestión.		
TOXICIDAD	Grupo III, poco peligroso.		
AUTORIZACION SAG	1806		

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Imidacloprid 70% WS es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, recomendado para el tratamiento de semillas de cereales, ballicas y remolacha. Inicialmente protege la semilla contra insectos del suelo y luego, una vez germinada, protege las plántulas de insectos chupadores y/o vectores de enfermedades virosas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (g/100 kg de semilla)	Observaciones	Carencia (días)
Avena Cebada Centeno Trigo Triticale	Gusano alambre Gorgojo argentino Pulgones (pulgón amarillo de los cereales, pulgón de la hoja del maíz y pulgón negro de los cereales)	100	Mezclar en húmedo, asegurando un cubrimiento adecuado de las semillas. Agregar 2 L de agua por cada 100 kilos de semilla o un gasto de 1,5 L/kg de producto aplicado.	NC
	Gusano blanco	50		
Ballica	Gorgojo argentino Gusano alambre	600 (150 g/ha)	Mezclar en seco con la cantidad de semillas para 1 ha (aprox. 30 kg de semilla) o en húmedo con 4 L/100 kg de semilla.	NC
	Gusano blanco	400 (100 g/ha)		
Maíz	Gusano alambre Larvas de burrito Larvas de <i>Delia platura</i>	580 - 870 según densidad de siembra 0,0016 g/ semilla; 128 g/80.000 semillas; 192 g/120.000 semillas	Mezclar en húmedo, con adecuado cubrimiento de las semillas. Agregar 0,8 a 1,5 L/100 kg de semilla.	NC
	Gorgojo argentino Gusano blanco Pulgones (pulgón amarillo de los cereales, pulgón de la hoja del maíz, pulgón negro de los cereales)	500 - 750 según densidad de siembra 0,0014 g/ semilla; 110 g/80.000 semillas; 170 g/120.000 semillas		
Remolacha azucarera	Gusano alambre Gusanos blancos Langostino de la remolacha Larvas de <i>Delia platura</i> Pulgón verde del duraznero	130 g/unidad de semilla monogérmica	Mezclar en el proceso de peletización o pildoración de semillas, con un adecuado y parejo cubrimiento de éstas. Verificar el control de minahojas y langostinos después de 45 o 50 días de la siembra de las semillas tratadas.	NC

PRECAUCIONES

- No aplicar mediante el tradicional tambor rotativo, ya que no es eficaz.
- En caso de tratamiento en húmedo, dejar secar las semillas a la sombra y una vez secas proceder a sembrar.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“MUY TÓXICO”**
 - Debe dar aviso a los apicultores que se encuentren dentro del área de aplicación y zona de influencia al menos 48 horas antes de la fecha y hora de la aplicación.
 - Aplicar en horarios de baja actividad de las abejas, como temprano en la mañana o al atardecer.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico ni produce disminución del poder germinativo, si se utiliza según la forma y dosis que se indican.

INCOMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos fuertemente alcalinos u oxidantes.

TIEMPO DE REINGRESO

No corresponde debido a la forma de aplicación.