



<b>NOMBRE COMUN</b>	Kaktiv	
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Potasio	
<b>FORMULACION</b>	Polvo Soluble (SP)	
<b>COMPOSICION</b>	Potasio (K <sub>2</sub> O)	% p/p 38,6

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Kaktiv** es un fertilizante foliar 100% soluble, formulado en base a potasio altamente concentrado, lo que permite una rápida absorción por parte de la planta y/o frutos. Se recomienda en berries, carozos, vides y otros para mejorar la calidad, aspecto, tamaño y uniformidad de los frutos.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Vid de mesa Vid vinífera	150 - 250	Parronal: 2,5 mín.  Espaldera: 1 mín.	Aplicar desde inicio de la brotación a pinta. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: - Parronal: 1.500 L/ha máx. - Espaldera: 1.200 L/ha máx.
Vid vinífera	250 - 350	Espaldera: 2,8 mín.	Aplicar desde pinta a precosecha. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha.
Vid de mesa	--	3,75	Aplicar desde pinta a precosecha con equipo electrostático. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 80 L/ha.
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	200 - 350	3 mín.	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha. Desde pinta, usar la dosis máxima. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Mandarino	250	--	Aplicar desde inicio de brotación, mientras exista crecimiento nuevo. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Aplicaciones: 3 máx. por brotación. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.
Arándano	350	2,1 - 3,5	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.
Frambueso Frutilla Zarzaparrilla	350	2,1 - 2,8	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 400 - 800 L/ha.
Pimentón Tomate	250 - 400	2 mín.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta antes de la cosecha. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Los equipos de aplicación deben estar correctamente calibrados.
- La aplicación debe ser con gota fina y un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. El escurrimiento o sobredosis de producto puede generar depósitos visibles en bayas y frutos.
- No aplicar con temperatura mayor a 25°C. En mandarinos, no aplicar con temperatura mayor a 20° C.
- No acidificar.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar agua al estanque hasta la mitad del volumen requerido con el agitador en funcionamiento. Luego, agregar lentamente al estanque la cantidad requerida de **Kactiv**. Finalmente, completar el volumen de agua agitando constantemente. Aplicar inmediatamente después de realizar la dilución del producto.

## FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.
- Es posible observar temporalmente depósitos blancos sobre bayas o frutos, que desaparecerán con el tiempo.

## COMPATIBILIDAD

- Compatible con surfactantes neutros.
- Se recomienda aplicar solo. En caso de requerir mezclar con otros productos, consultar al Depto. Técnico de Agrospec.

## INCOMPATIBILIDAD

- Incompatible con productos de reacción ácida o que no puedan mezclarse con productos de reacción alcalina.
- No se recomienda aplicar en mezcla con productos con acción penetrante.