



NOMBRE COMUN	Miclobutanil 240 EC
INGREDIENTE ACTIVO	Miclobutanil
GRUPO QUIMICO	Triazoles
FORMULACION	Concentrado Emulsionable (EC)
COMPOSICION	Miclobutanil 24% p/v (240 g/L) Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Sistémico, preventivo y curativo.
TOXICIDAD	Grupo III, poco peligroso.
AUTORIZACION SAG	2.990

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Miclobutanil 240 EC es un fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo. Pertenece a la familia de los triazoles, inhibidores de la biosíntesis del ergosterol. Se recomienda para el control de oídio en vides, remolacha, cucurbitáceas, tomate, pimiento, papa y cereales y repilo en olivo.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (*)	Observaciones	Carencia (días)
Vides	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	10 - 12 cc/ 100 L	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 - 10 cm de largo. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Alternar con productos de distinto modo de acción. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 12 días. Mojamiento sugerido: 500 - 2.000 L/ha, dependiendo del sistema de conducción y volumen de follaje.	Vid de mesa: 10
Olivo	Repilo (<i>Fusicladium oleagineum</i>)	12 cc/ 100 L	Aplicar desde postcosecha y hasta antes de la floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Aplicar con buen cubrimiento, acorde al desarrollo del cultivo. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.	70
Pimiento Tomate	Oídio (<i>Oidium lycopersici</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	120 - 200 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aumentar las dosis de aplicación a medida que crece el cultivo. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	Pimiento: 3 Tomate: 10
Alcachofa	Oídio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	120 - 200 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aumentar la dosis de aplicación a medida que crece el cultivo. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	3
Remolacha	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 - 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L/ha.	28
Papa	Oídio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente, desde el momento en que se observen los primeros signos de oídio. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 15 - 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L/ha.	3
Arroz Avena Cebada Centeno Trigo	Oídio (<i>Blumeria graminis</i>)	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 - 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	20
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Oídio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	130 - 170 cc/ha	Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 - 20 días. Mojamiento sugerido: 500 L/ha.	3

*: utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor con alta presión de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (*) cc/ha	Observaciones	Carencia (días)
Olivo	Repilo (<i>Fusicladium oleagineum</i>)	240 - 300 cc/ha	Iniciar las aplicaciones en postcosecha y aplicar hasta antes de la floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 60 L/ha.	70

*: utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor con alta presión de la enfermedad.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando **Miclobutanil 240 EC** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar el estanque y aplicar.

PRECAUCIONES

- Para evitar problemas de resistencia, alternar con productos de distinto modo de acción.
- En aplicaciones de precosecha, observar la carencia.
- No aplicar con viento mayor a 8 km/hora, temperaturas mayores a 25°C, ni con alta humedad ambiental.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“VIRTUALMENTE NO TÓXICO”**.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado de acuerdo con lo recomendado.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Si se utiliza en mezcla con otros fitosanitarios, se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

INCOMPATIBILIDAD

No aplicar con productos de reacción alcalina o ácida. No mezclar con Caldo Bordolés y Polisulfuro de calcio

TIEMPO DE REINGRESO

24 horas después de ser aplicado.