

NOMBRE COMUN	Miclobutanil 40% WP
INGREDIENTE ACTIVO	Miclobutanil
NOMBRE QUIMICO	2-(p-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) hexanonitrilo
GRUPO QUIMICO	Triazoles
FORMULACION	Polvo Mojable (WP)
COMPOSICION	Miclobutanil 40% p/p (400 g/kg) Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1 kg)
MODO DE ACCION	Sistémico, preventivo y curativo
TOXICIDAD	Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro
AUTORIZACION SAG	2661

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Miclobutanil 40% WP es un fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo, recomendado para el control de enfermedades foliares y de los frutos. Pertenecce a los triazoles, por lo que su modo de acción está dado por la inhibición de la biosíntesis del ergosterol. Se recomienda para el control preventivo y curativo de oídio en vides, manzano, carozos, remolacha y cucurbitáceas, y de venturia en manzanos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vides	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	7,5 g/ 100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 a 10 cm de largo, repitiendo cada 10 a 12 días. Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	Vid de mesa: 10
Manzano Peral	Venturia (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	7,5 - 10 g/ 100 L de agua	Iniciar las aplicaciones en puntas verdes, repitiendo cada 7 a 10 días o según condiciones. Efecto retroactivo: 96 horas condiciones. Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha. Aplicaciones por temporada: 3.	Manzano: 10 Peral: 7
Manzano	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	10 - 12,5 g/ 100 L de agua	Iniciar las aplicaciones en caída de pétalos y repetir si es necesario cada 10 a 14 días. Mojamiento: 2.000 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	10
Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	8 - 10 g/ 100 L de agua	Aplicar con fruto tamaño arveja o con los primeros síntomas. Repetir cada 15 días, hasta endurecimiento del carozo. Mojamiento: 2.000 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	3
	Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>)	250 - 300 g/ha	Realizar la primera aplicación con botón rosado y repetir en caso de lluvia, si fuera necesario. Mojamiento: 2.000 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	
Pimiento Tomate	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	75 - 120 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. En la medida que crece el cultivo aumentar las dosis de aplicación. Mojamiento: 200 - 300 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	Pimiento: 3 Tomate: 10
Remolacha	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	125 - 150 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Aplicaciones por temporada: 2.	28

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Melón Sandía Zapallo	Oídio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	80 - 100 g/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 500 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	3

PRECAUCIONES

Para evitar problemas de resistencia, intercalar con productos de distinto modo de acción.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Si se utiliza en mezcla con otros fitosanitarios, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de reacción alcalina, caldo bordelés ni polisulfuro de calcio.

TIEMPO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.