



NOMBRE COMUN	Polisulfuro de Calcio 350 SL
INGREDIENTE ACTIVO	Polisulfuro de calcio
GRUPO QUIMICO	Calcogenuros
FORMULACION	Concentrado Soluble (SL)
COMPOSICION	Polisulfuro de calcio 34,8% p/v (348 g/L) Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Contacto
TOXICIDAD	Grupo II, moderadamente peligroso
AUTORIZACION SAG	2850-O Autorizado para agricultura orgánica

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Polisulfuro de Calcio 350 SL** es un fungicida, insecticida y acaricida con acción de contacto. Actúa directamente sobre el exoesqueleto de insectos y estructuras de resistencia de hongos y también actúa por descomposición del activo a H<sub>2</sub>S (ácido sulfhídrico). Se recomienda para el control invernal de insectos, arañas y hongos en frutales y vides.

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (L/100 L)	Observaciones	Carencia (días)
Manzano Peral	Escama de San José Chanchitos blancos	8 - 10	Aplicar durante receso invernal. Aplicaciones por temporada: 4. Mojamiento sugerido: 1.000 - 3.000 L/ha.	NC
	Venturia Oídio	2 - 6	Aplicar en receso invernal, antes de yema hinchada. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 - 3.000 L/ha.	
Vides	Chanchitos blancos	8 - 10	Aplicar en receso invernal temprano. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 - 3.000 L/ha.	NC
Almendro	Oídio Botritis	4 - 6	Aplicar en receso invernal temprano. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 - 3.000 L/ha.	NC
Cerezo	Escama de San José Chanchitos blancos	6 - 8	Aplicar durante el receso invernal, hasta antes de la ruptura de las yemas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 - 2.000 L/ha.	NC
Duraznero Nectarino	Escama de San José Chanchitos blancos Oídio Cloca Corineo	6 - 8	Aplicar en pleno receso invernal temprano, después de caída de hojas y hasta el estado latente tardío (antes de la ruptura de yemas). Aplicaciones por temporada: 4 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha.	NC
Ciruelo	Escama de San José Chanchitos blancos Corineo	6 - 8	Aplicar en pleno receso invernal temprano, después de caída de hojas y hasta el estado latente tardío (antes de la ruptura de yemas). Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 - 2.000 L/ha.	NC
Kiwi	Escama de San José Chanchitos blancos	4	Aplicar durante el receso invernal. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha	NC
Avellano	Escama San José Chanchitos blancos Arañita roja europea	4 - 6	Aplicar durante el receso invernal Aplicaciones por temporada: 1 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha.	NC

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/100 L)	Observaciones	Carencia (días)
Arándano	Escama blanca Chanchitos blancos	5 - 8	Aplicar en receso invernal. temprano, hasta antes de la ruptura de las yemas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.	NC
Frambueso Mora	Escama blanca Chanchitos blancos Oídio	6 - 12	Aplicar en receso invernal temprano, hasta antes de la ruptura de las yemas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.	NC

Dosis: usar dosis mayor cuando exista mayor presión de la plaga o enfermedad.

NC: No corresponde.

## CARENCIAS

No corresponde aplicar carencias, ya que es aplicado en invierno.

## PRECAUCIONES

- Se debe evitar aplicar en días de mucho calor, con temperaturas mayores a 28°C. No aplicar con viento superior a 10 km/hora para evitar la dispersión.
- Evitar aplicar en días húmedos. Días secos y sin vientos son los más adecuados. Si llueve hasta 3 días después de la aplicación, será necesario repetirla.
- Realizar la pulverización dirigiéndola de arriba hacia abajo y viceversa, girando lentamente en torno al árbol.
- Usar máquinas pulverizadoras cuyos componentes que puedan estar en contacto con la solución, no sean de cobre.
- Durante la aplicación, realizar la pulverización o aspersion utilizando gota gruesa, de manera de obtener punto de goteo. Evitar la disipación del producto a través de la formación de una neblina.
- Alternar con otros insecticidas y/o fungicidas de distinto modo de acción, para disminuir poblaciones resistentes.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS”**.

## FITOTOXICIDAD

- No existen riesgos de fitotoxicidad aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso recomendadas.
- No realizar aplicaciones en yema hinchada.
- Se debe aplicar solo en receso invernal o dormancia, ya que al haber presencia de tejido nuevo o verde se producen quemaduras y, por lo tanto, fitotoxicidad.

## INCOMPATIBILIDAD

- No mezclar con otros fitosanitarios por ser incompatible con la mayoría de ellos.
- No mezclar con aceites.

## TIEMPO DE REINGRESO

48 horas después de la aplicación.