



NOMBRE COMUN	Propiconazol 250 EC
INGREDIENTE ACTIVO	Propiconazol
GRUPO QUIMICO	Triazoles
FORMULACION	Concentrado Emulsionable (EC)
COMPOSICION	Propiconazol 25% p/v (250 g/L) Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Sistémico, preventivo y curativo
TOXICIDAD	Grupo II, producto moderadamente peligroso
AUTORIZACION SAG	2822

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Propiconazol 250 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, recomendado para el control de enfermedades fungosas en frutales, apio y cereales, en aplicaciones terrestres o aéreas.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación terrestre

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Avena Cebada Centeno Maíz Trigo	Oídio (<i>Erysiphe graminis</i>) Royas (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. recondita</i>) Septoriosis (<i>Septoria tritici</i>) Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0,5 L/ha	Realizar la primera aplicación en forma preventiva, al aparecer la hoja bandera o los primeros síntomas de la enfermedad. Para el control de septoriosis en trigo, aplicar a partir del 2º nudo o tan pronto aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Repetir al reaparecer los síntomas o ante condiciones de reinfestación. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L /ha.	Avena, Centeno: 50 Cebada: 35 Maíz: 30 Trigo: 55
Damasco Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,5 L/ha	Aplicar al inicio de caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días, hasta endurecimiento de carozo o condiciones de reinfestación. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Damasco: 15 Duraznero: 4 Nectarino: 3
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Tizón de la flor o Moniliasis (<i>Monilia laxa</i>)	0,5 L/ha	Aplicar a inicios de flor y repetir en plena flor, si hubiera condiciones predisponentes a la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Almendro: 53 Cerezo, Ciruelo, Nectarino: 3
	Roya (<i>Tranzschelia discolor</i>)	0,5	Aplicar antes de que aparezcan los síntomas, desde mediados de noviembre. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 3 - 4 semanas. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Damasco: 15 Duraznero: 4
Duraznero Nectarino	Pudrición ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	50 cc/100 L (500 cc/ha mín.)	Aplicar 5 a 7 días previos a la cosecha. Para cosechas de más de 15 días, repetir la aplicación a los 7 - 10 días. Aplicaciones por temporada: 2, máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Duraznero: 4 Nectarino: 3
Apio	Septoriosis (<i>Septoria apii</i>)	0,5	Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 - 18 días. Mojamiento: 200 - 400 L/ha.	50

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Avena Cebada Centeno Maíz Trigo	Oídio (<i>Erysiphe graminis</i>)	0,5 L/ha	Realizar la primera aplicación en forma preventiva al aparecer la hoja bandera o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Para el control de Septoria en trigo, aplicar a partir del 2º nudo cuando existan síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Repetir al reaparecer los síntomas o ante condiciones de reinfestación. Mojamiento sugerido: 40 L/ha.	Avena
	Royas (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. recondita</i>)			Centeno: 50
	Septoriosis (<i>Septoria tritici</i>)			Cebada: 35
	Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			Maíz: 30
				Trigo: 55

PREPARACION DE LA MEZCLA

Para cada una de las aplicaciones, agregar **Propiconazol 250 EC** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar el estanque con agua y aplicar.

PRECAUCIONES

- Para evitar la aparición de razas resistentes contemplar, antes y después del uso de **Propiconazol 250 EC**, la aplicación de otros fungicidas o mezclas que incluyan otros grupos químicos y/o distintos modos de acción a los IBE/triazoles.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas **“LIGERAMENTE TÓXICO”**.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se utiliza en los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los insecticidas y herbicidas de uso común. En caso de dudas realizar prueba de compatibilidad.

INCOMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción alcalina.

TIEMPO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.