



NOMBRE COMUN	Sulfur 600 FLO	
INGREDIENTE ACTIVO	Azufre	
GRUPO QUIMICO	Calcogenuros	
FORMULACION	Suspensión Concentrada (SC)	
COMPOSICION	Azufre Coformulantes c.s.p.	60% p/v (600 g/L) 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo	
TOXICIDAD	Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro	
AUTORIZACION SAG	2703	

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Sulfur 600 FLO es un fungicida con acción de contacto, recomendado para el control preventivo de oídio en vides, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, remolacha, hortalizas y plantas ornamentales.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 L)	Observaciones	Carencia (días)
Vides	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	200 - 400	Aplicar preventivamente. Iniciar con brotes de 10 - 15 cm de largo. Aplicaciones por temporada: 10. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	NC
Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	200 - 400	Aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días. Mojamiento sugerido 1.500 L/ha.	NC
Ciruelo Duraznero Nectarino	Roya o Polvillo (<i>Tranzchelia discolor</i>)		Aplicar al observar las primeras pústulas en las hojas. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	
Manzano	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	pre-floración: 300 - 400 post-floración: 150 - 200	Aplicar antes de inicio de floración y en caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	NC
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Oídio o Peste ceniza (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	200 - 300	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 14 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha.	NC
Alcachofa Arveja Frejol Papa Tomate	Oídio o Peste ceniza (<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i>)	200 - 300	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos de la enfermedad. Aplicaciones por temporada para alcachofa, papa y tomate: 3. Aplicaciones por temporada para arveja y frejol: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 14 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha.	NC

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 L agua)	Observaciones	Carencia (días)
Rosa Clavel Crisantemo Gladiolo Hortensia	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	200 - 300	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 10 días. Mojamiento sugerido: 200 L/ha.	NC
Remolacha	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	4 - 8 L/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	NC

PREPARACION DE LA MEZCLA

Disolver la cantidad requerida de **Sulfur 60 FLO**, usando solo un 20% del volumen del estaque. Luego verter en el estanque del equipo aplicador, que ha sido llenado previamente hasta la mitad con agua, con el agitador funcionando. Finalmente completar con agua agitando constantemente.

CARENCIAS

No posee carencias. Exento de tolerancias.

FITOTOXICIDAD

No aplicar en damascos por ser fitotóxico a este frutal.

PRECAUCIONES

- No aplicar con viento fuerte, con calor excesivo (temperaturas mayores a 25°C) ni con alta humedad ambiental.
- Utilizar dosis mayor cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para una mayor presión de la enfermedad.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas “**VIRTUALMENTE NO TÓXICO**”.

INCOMPATIBILIDAD

- Incompatible con formetanate HCl, fenvalerato, clorpirifos y dinitrofenoles.
- Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

TIEMPO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.