



NOMBRE COMUN	Sulfur 80% WG	
INGREDIENTE ACTIVO	Azufre	
GRUPO QUIMICO	Calcogenuros	
FORMULACION	Gránulos Dispersables (WG)	
COMPOSICION	Azufre Coformulantes c.s.p.	80% p/p (800 g/kg) 100% p/p (1 kg)
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo	
TOXICIDAD	Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro	
AUTORIZACION SAG	2457- O Autorizado para agricultura orgánica	

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Sulfur 80% WG es un fungicida de contacto, destinado al control de oídio en uva de mesa, vid vinífera, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano y hortalizas, entre otros cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	200 – 300 g/ 100 L agua	Aplicar preferentemente como preventivo. Iniciar con brotes de 10 a 15 cm de largo y repetir cada 8 días. Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha. En postcosecha, previo a la caída de las hojas y de ser necesario, realizar 1 o 2 aplicaciones. Aplicaciones por temporada: 10. Mojamiento: 1.500 L/ha. Usar la dosis máxima en condiciones favorables.	NC
Ciruelo Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	300 - 400 g/ 100 L agua	En duraznero y nectarino, aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante.	NC
	Roya o Polvillo (<i>Tranzchelia discolor</i>)	250 - 300 g/ 100 L agua	Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Repetir si fuera necesario luego de 10 a 15 días. Aplicaciones por temporada: 3 Mojamiento: 1.500 L/ha.	
Manzano	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	Pre-floración: 400 - 600 g/ 100 L agua Post-floración: 200 - 300 g/ 100 L agua	Primera aplicación en caída de pétalos. Repetir si fuera necesario cada 10 a 14 días. Las aplicaciones deben hacerse previo a cambio de color de la fruta. En variedades rojas, no aplicar en mezcla con Captan. Aplicaciones por temporada: 3 Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha.	NC
Frambueso	Oídio (<i>Podosphaera macularis</i>)	250 - 350 g/ 100 L agua	Aplicar desde la aparición de los primeros signos, cada 10 días. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento: 600 - 800 L/ha, de acuerdo con el follaje.	NC
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Oídio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, repitiendo cada 7 a 14 días. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento: 400 L/ha.	NC
Arveja Frejol	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)		Aplicaciones por temporada: 2.	

Cultivo	Enfermedad	Dosis (g/100 L agua)	Observaciones	Carencia (días)
Alcachofa Papa Tomate	Oídio o Peste ceniza (<i>Golovinomyces Cichoracearum</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Cada 10 días. Aplicaciones por temporada: 3. Mojamiento: 400 L/ha.	NC
Arveja Poroto	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)		Aplicaciones por temporada: 2.	
Remolacha	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	4 - 5 kg/ha	Preventivo o al observar los primeros signos. Repetir cada 7 a 14 días. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento; 200 - 400 L/ha.	NC
Ornamentales	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	4 - 5 kg/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Repetir cada 7 a 14 días. Mojamiento: 200 L/ha.	NC

NC: No corresponde

CARENCIAS

Producto que no posee carencias, ya que está exento de tolerancias.

PRECAUCIONES

No aplicar el producto sobre follaje humedecido o en condiciones de alta temperatura, mayores a 30 ° C.

INCOMPATIBILIDAD

Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

TIEMPO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.