



NOMBRE COMUN	Tebuconazol 430 SC
INGREDIENTE ACTIVO	Tebuconazol
GRUPO QUIMICO	Triazoles
FORMULACION	Suspensión Concentrada (SC)
COMPOSICION	Tebuconazol 43% p/v (430 g/L) Coformulantes c.s.p 100% p/v (1 L)
MODO DE ACCION	Sistémico, preventivo y curativo.
TOXICIDAD	Grupo III, producto poco peligroso.
AUTORIZACION SAG	2991

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Tebuconazol 430 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo.
En precosecha se recomienda para el control de botritis y oídio en vides; tizón de la flor, oídio y botritis en carozos, y botritis en pino.
En postcosecha se recomienda para el control de botritis en cerezas, ciruelas, duraznos y nectarines.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación de precosecha:

Cultivo	Enfermedad	Dosis* (g/100 L)	Observaciones	Carencia (días)
Vides	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	60 - 70	Controla simultáneamente ambas enfermedades. Aplicar en estadios críticos, inicio y plena flor y, en especial, cuando existan condiciones favorables para su desarrollo. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo de aplicación: 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Vid de mesa: 7
	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	25	Aplicar preventivamente, desde brotación en adelante. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo de aplicación: 14 días. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha, según desarrollo del cultivo.	
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> <i>Monilia laxa</i>)	30 - 40	Aplicar en botón y plena flor. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	Almendro: 20 Cerezo: 1 Ciruelo, Damasco, Duraznero y Nectarino: 5
	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	20 - 35	Aplicar desde caída de pétalos a endurecimiento de carozo. En variedades de nectarinos y durazneros muy susceptibles a Oídio, iniciar las aplicaciones en botón floral. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalos entre aplicaciones: 15 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	
	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	40	Aplicar desde botón rosado hasta caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	
Eucalipto Pino	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 - 75	Iniciar aplicaciones con plantas de 10 cm de altura. Repetir con condiciones predisponentes a la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 6. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 150 L/ha.	No corresponde
Viveros: Eucalipto Pino	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 - 70	Aplicar preventivamente cuando existan condiciones ambientales favorables. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 días. Mojamiento sugerido: 150 L/ha.	No corresponde

*: utilizar la dosis mayor cuando existan condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y/o exista alta presión de la enfermedad. Utilizar la dosis menor bajo condiciones normales de prevención de enfermedades.

Aplicación postcosecha:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (g/100 L)	Observaciones	Carencia (días)
Ciruela Durazno	Botritis o moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 - 120	Aplicar como tratamiento de postcosecha, sumergiendo o duchando la fruta con la suspensión del fungicida durante 30 a 60 segundos.	0
Cereza Nectarín		60		

PRECAUCIONES

- Antes y después del uso de **Tebuconazol 430 SC**, considerar la aplicación de otros fungicidas o mezclas que incluyan otros grupos químicos y/o distintos modos de acción a los IBE/triazoles.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas “**VIRTUALMENTE NO TÓXICO**”.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de dudas realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala.

INCOMPATIBILIDAD

Incompatible con productos fuertemente alcalinos.

TIEMPO DE REINGRESO

12 horas después de ser aplicado.