

Programa fitosanitario **almendros**



Almendros		Previo a caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Post-cosecha
Enfermedades	Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{250 EC} 0,5 L/ha		piraclostrobin ^{250 EC} 0,5 L/ha				
	Reducir presión de enfermedades		polisulfuro ^{350 SL} CALCIO					
	Hongos de la madera		podaspec					
	Roya Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				propiconazol ^{250 EC} 0,5 L/ha			
	Botritis Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				acierto ^{140 EC} 75 - 125 cc/100 L boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha difenconazol ^{250 EC} 20 cc/100 L piraclostrobin ^{250 EC} 0,5 L/ha (solo en floración)			
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				duomax ^{425 SC} 130 cc/100 L (mín. 1,3 L/ha)			
	Cloca Corineo Monilia				clorotalonil ^{500 SC} 180 - 200 cc/ha			
	Oídio Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				tebuconazol ^{430 SC} 35 - 40 cc/100 L			
Ácaros e Insectos	Escama de San José		piriproxifen ^{100 EC} 50 - 70 cc/100 L				acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L	
	Arañitas Trips		abamectin ^{18 EC} 80 - 100 cc/100 L			abamectin ^{18 EC} 80 - 100 cc/100 L		
	Arañita parda Arañita roja europea Arañita bimaculada			espirodiclofen ^{240 SC} 50 - 60 cc/ 100 L				
	Arañitas Burrito de la vid Eulía Pulgones					bifentrin ^{100 EC} 60 cc/100 L		bifentrin ^{100 EC} 60 cc/100 L
	Enrollador de los frutales Polilla oriental					metoxifenozyd ^{240 SC} 15 - 20 cc/100 L (mín. 300 cc/ha)		
	Pulgones					bifentrin ^{100 EC} 0,18 - 0,3 L/ha imidacloprid ^{70% WP} 10 - 15 g/100 L		
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 200 - 300 g/ha simazina ^{90% WG} 2 - 4 kg/ha						
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}						flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480 SL} 2,5 - 7 L/ha	(1)	glifospecplus ^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha	(1)	
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta			cletodim ^{240 EC} 0,4 - 2 L/ha				

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.