

Programa fitosanitario **arándanos**



Arándanos

	Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Inicio de flor	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Cosecha	Post-cosecha	
Enfermedades	Hongos de la madera	podaspec									
	Botritis				boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha	fusion ^{425 SC} 2 L/ha		boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha	fusion ^{425 SC} 2 L/ha		
									citrus ^{SL} 150 - 180 cc/100 L	citrus ^{SL} 150 - 180 cc/100 L	
Ácaros e Insectos	Reducir presión de plagas	polisulfuro ^{350 SL} CALCIO									
	Proeulia		bifentrin ^{100 EC} 12 cc/100 L								
	Chanchitos blancos						acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L				
	<i>Drosophila suzukii</i> <i>Lobesia botrana</i>						imidacloprid ^{200 SL} 80 - 100 cc/100 L		imidacloprid ^{200 SL} 80 - 100 cc/100 L		
	Burrito de la vid						acetamiprid ^{20% SP} 50 g/100 L	acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L		bifentrin ^{100 EC} 300 cc/ha	
Malezas	Anuales Perennes	glifospec ^{480 SL} ⁽¹⁾ 2 - 7 L/ha			glifospecplus ^{75% SG} ⁽¹⁾ 1,1 - 4 kg/ha			paraquat ^{27% SL} 3 L/ha			
	Hoja angosta anuales y perennes				cletodim ^{240 EC} 0,4 - 2 L/ha						
Otros	Uniformar brotación Adelantar cosecha	cianamida ^{500 SL}									

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Full 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Información de carácter referencial. Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.