

Programa fitosanitario **arándanos**



Arándanos

	Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Inicio de flor	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera	podaspec								
	<i>Fusicoccum putrefaciens</i> (hongo de la madera)	piraclostrobin ^{250EC} 0,75 L/ha								
	Botritis				boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha piraclostrobin ^{250EC} 0,5 L/ha tebuconazol ^{25% WP} 75 - 100 g/100 L			boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha fusion ^{425SC} 200 cc/100 L		
					citrus ^{SL} 150 - 180 cc/100 L			citrus ^{SL} 150 - 180 cc/100 L		
Ácaros e Insectos	Reducir presión de plagas	polisulfuro ^{350SL} CALCIO								
	Eulia		bifentrin ^{100EC} 12 cc/100 L clorantniliprol ^{200SC} 20 cc/100L metoxifenozyd ^{240SC} 25 cc/100 L							
	<i>Drosophila suzukii</i>					acetamiprid ^{20% SP} 50 g/100 L acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L espinosad ^{480SC} 0,2 L/ha				
	Lobesia					clorantniliprol ^{200SC} 20cc/100 L espinosad ^{480SC} 12 cc/100 L metoxifenozyd ^{240SC} 20 cc/100 L (mín. 300 cc/ha)				
	Trips de California					espinosad ^{480SC} 12 cc/100 L				
	Chanchitos blancos					acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L				
	Burrito de la vid					imidacloprid ^{200SL} 80 - 100 cc/100 L			imidacloprid ^{1200SL} 80 - 100 cc/100 L (chanchitos)	
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 200 - 300 g/ha simazina ^{90% WG} 2 - 4 kg/ha								
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480SL} o glifospecplus ^{75% SG}							flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480SL} o glifospecplus ^{75% SG}	
	Post-emergente: anuales y perennes		glifospec ^{480SL} 2 - 7 L/ha ⁽¹⁾		glifospecplus ^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha ⁽¹⁾					
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta			cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha						
Otros	Uniformar brotación Adelantar cosecha	cianamida ^{500SL}								

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.