


Programa fitosanitario **cerezos**



	Caída de hojas	Receso invernal	Botón floral	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento vegetativo	Crecimiento de fruto	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera									podaspec
	Estructuras de resistencia									polisulfuro CALCIO
	Botritis Monilia Monilinia Podrición ácida				tebuconazol 120 g/100 L tebuconazol 60 - 70 cc/100 L				Podrición ácida: tebuconazol 120 g/100 L tebuconazol 60 - 70 cc/100 L	
	Botritis				boscalid 1,2 kg/ha fusion 2 L/ha mín.				boscalid 1,2 kg/ha fusion 2 L/ha mín.	
	Packing: Botritis									tebuconazol 60 cc/100 L
Ácaros e Insectos	Estados invernantes									polisulfuro CALCIO
	Escama de San José									piriproxifen 50 - 70 cc/ 100 L
	Arañitas									abamectin. 60 - 100 cc/100 L
	Polillas Pulgón verde Eulia Chape									espirodiclofen 50 - 60 cc/100 L
	Escama de San José Polillas Chanchitos blancos Trips Langostino del manzano									lambda CHALOTRINA 250 cc/ha
	<i>Drosophila suzukii</i>									acetamiprid 50 g/100 L acetamiprid 15 g/100 L
	Araña bimaclada Polillas Pulgón del duraznero									acetamiprid 15 g/100 L acetamiprid 50 g/100 L lambda CHALOTRINA 20 cc/100 L juno 25 g/100 L (sólo al inicio de post-cosecha)
Malezas	Anuales Perennes									glifospec ⁽²⁾ 2 - 7 L/ha glifospec plus ⁽²⁾ 1,1 - 4 kg/ha paraquat 3 L/ha
	Hoja angosta anuales y perennes									cletodim 0,4 - 2 L/ha
Otros	Uniformar brotación Adelantar cosecha									cianamida
	Protector solar									reflexsol ^{WP} 25 - 30 kg/ha

(1): sin etiqueta para chanchitos blancos.

(2): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.