

Programa fitosanitario **ciruelos**



	Caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Cortes de poda		podaspec (no utilizar en ciruelos con cosecha mecanizada)							
Reducir presión de enfermedades		polisulfuro CALCIO							
Tizón de la flor (Botrytis cinerea, Monilia laxa)				tebuconazol 40 cc/100 L					
Tizón de la flor (Monilia laxa)				propiconazol 0,5 L/ha					
Botritis				boscalid 1,2 kg/ha				boscalid 1,2 kg/ha	
Roya					propiconazol 0,5 L/ha				
Cuerudo (complejo de hongos bajo la chaqueta)					sulfur 200 - 400 cc/100 L	sulfur 250 - 400 g/100 L	sulfur 250 - 400 g/100 L		
Botritis Pudrición ácida					kresoxim METIL 13 cc/100 L				tebuconazol 60 - 70 cc/100 L
Reducir presión de plagas		polisulfuro CALCIO							
Escama de San José		piriproxifen 50 - 60 cc/100 L							
Arañitas Trips					abamectin 80 - 100 cc/100 L				
Arañitas							espiroclorfen 50 - 60 cc/100 L		
Escama de San José Polillas Trips californiano Pulgones Drosophila suzukii							acetamiprid 50 g/100 L	acetamiprid 15 g/100 L (también controla chanchitos blancos)	
Lobesia botrana							acetamiprid 50 g/100 L	acetamiprid 15 g/100 L	lambda CHALOTRINA 20 cc/100 L
Polillas Pulgones Eulia Gusano de los penachos							lambda CHALOTRINA 200 - 250 cc/ha		
Chanchitos blancos Pulgones							imidacloprid 80 - 100 cc/100 L	imidacloprid 10 - 15 g/100 L (solo pulgones)	
Araña bimaculada Polilla oriental Enrollador de los frutales Pulgón verde									bifentrin araña bimaculada: 60 cc/100 L (otras plagas: 8 - 15 cc/100 L)
Anuales Perennes			glifospec 2 - 7 L/ha		glifospec plus 1,1 - 4 kg/ha		paraquat 3 L/ha		
Hoja angosta anuales y perennes					cletodim 0,4 - 2 L/ha				

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.