


Programa fitosanitario **ciruelos**



Enfermedades

Ácaros e Insectos

Malezas

	Previo a caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha	
Cáncer bacterial	 0,5 L/ha		 0,5 L/ha							
	 (no utilizar en ciruelos con cosecha mecanizada)									
										
				 0,5 L/ha						
				 40 cc/100 L						
				 0,5 L/ha						
				 1,2 kg/ha				 1,2 kg/ha		
					 0,5 L/ha					
					 200 - 400 cc/100 L					
					 13 cc/100 L					
Cortes de poda										
		 50 - 60 cc/100 L								
				 80 - 100 cc/100 L						
				 12 cc/100 L (<i>Drosophila suzukii</i> : 200 cc/ha)						
				 20 cc/100 L (excepto gusano de los penachos)		 15 - 20 cc/100 L				
				 50 g/100 L	 15 g/100 L	 20 cc/100 L				
				 12 cc/100 L	 20 cc/100 L	 20 cc/100 L				
				 200 - 250 cc/ha				 200 - 250 cc/ha		
				 80 - 100 cc/100 L	 10 - 15 g/100 L (solo pulgones)					
				 50 - 60 cc/100 L						
Roya							 50 g/100 L	 15 g/100 L (también controla chanchitos blancos)	 50 g/100 L	 15 g/100 L (también controla chanchitos blancos)
									 60 cc/100 L	
		 200 - 300 g/ha	 2 - 4 kg/ha							
	 50 - 100 g/ha +  o 								 50 - 100 g/ha +  o 	
				 2 - 7 L/ha		 1,1 - 4 kg/ha				
				 0,4 - 2 L/ha						

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.