

Programa fitosanitario cítricos



	Post-cosecha	Brotación	Inicio floración	Floración	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pinta	Pre-cosecha	Cosecha
Enfermedades	<p><i>Phytophthora</i> (extirpación de canchros)</p> <p>podaspec</p>								
Ácaros e insectos	Arañitas		<p>abamectin^{18EC} 75 cc/100 L</p>		<p>abamectin^{18EC} 75 cc/100 L</p>		<p>abamectin^{18EC} 75 cc/100 L</p>		
	Escama roja		<p>piriproxifen^{100EC} 75 cc/100 L</p>						
	Mosquitas blancas Conchuela negra		<p>piriproxifen^{100EC} 30 - 50 cc/100 L</p>						
	Escama roja Chanchitos blancos Mosquitas blancas	<p>acetamiprid^{20%SP} 50 g/100 L (1)</p>			<p>acetamiprid^{20%SP} 50 g/100 L (1)</p>				
	Chanchitos blancos Mosquitas blancas Pulgones	<p>acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L</p>			<p>acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L</p> <p>imidacloprid^{200SL} 80 - 100 cc/100 L (pulgones: 30 - 50 cc/100 L)</p>				
	Chanchitos blancos Conchuelas Escamas Mosquitas blancas Pulgones Trips					<p>imidacloprid^{200SL} 25 - 30 g/100 L (pulgones y mosquitas: 10 - 15 g/100 L)</p>			
Malezas	Anuales Perennes		<p>glifospec^{480SL} 2 - 7 L/ha (2)</p>		<p>glifospecplus^{75%SG} 1,1 - 4 kg/ha (2)</p>		<p>paraquat^{276SL} 3 L/ha</p>		
	Hoja angosta anuales y perennes				<p>cletodim^{240EC} 0,4 - 2 L/ha</p>				
Otros	Golpe de sol Estrés térmico					<p>reflexsol^{PLUS} 15 - 50 kg/ha</p> <p>reflexsol^{WP} 15 - 50 kg/ha (3)</p>			

(1): chanchitos blancos solo en mandarino.

(2): las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

(3): autorizado para agricultura orgánica.

Esta información es de carácter referencial. Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto. Para información de dosis, consultar a su representante zonal.