

Programa fitosanitario **cítricos**





Cítricos

Cítricos		Post-cosecha	Brotación	Inicio floración	Floración	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pinta	Pre-cosecha
Enfermedades	<i>Phytophthora</i> (extirpación de canchros)	podaspec							
	Oídio (mandarinos)		acierto^{140EC} 75 cc/100 L						
			difenoconazol^{250EC} 20 cc/100 L						
Ácaros e insectos	Polillas plegadoras	metoxifenozyd^{240SC} 20 cc/100 L							metoxifenozyd^{240SC} 20 cc/100 L
		bifentrin^{100EC} 60 cc/100 L							
	Arañitas		abamectin^{18EC} 75 cc/100 L			abamectin^{18EC} 75 cc/100 L			
						bifentrin^{100EC} 50 cc/100 L			
						espirodiclofen^{240SC} 50 - 60 cc/100 L			
	Escama roja Mosquitas blancas Conchuela negra		piriproxifen^{100EC} 30 - 50 cc/100 L escama roja: 60 cc/100 L						
	Escama roja Chanchitos blancos Mosquitas blancas Pulgones		acetamiprid^{20%SP} 50 g/100 L			acetamiprid^{20%SP} 50 g/100 L			
	Chanchitos blancos Mosquitas blancas Pulgones		acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L			acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L		acetamiprid^{20%SP} 80 - 100 cc/100 L (pulgones: 30 - 50 cc/100 L)	
Chanchitos blancos Conchuelas Escamas Mosquitas blancas Pulgones Trips						imidacloprid^{70%WP} 25 - 30 g/100 L pulgones y mosquitas: 10 - 15 g/100 L imidacloprid^{200SL} mosquita blanca y chanchitos blancos: 80 - 100 cc/100 L pulgones: 30 - 50 cc/100 L			
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50%WP} 200 - 300 g/ha	simazina^{90%WG} 2 - 4 kg/ha						
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50%WP} 50 - 100 g/ha + glifospec^{480SL} o glifospecplus^{75%SG}							
	Post-emergente: anuales y perennes	glifospec^{480SL} 2 - 7 L/ha				glifospecplus^{75%SG} 1,1 - 4 kg/ha			
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta	cletodim^{240EC} 0,4 - 2 L/ha							

(1): las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto. Para información de dosis, consultar a su representante zonal.