


Programa fitosanitario **kiwis**



Kiwis		Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Botón floral	Plena flor	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera		podaspec polisulfuro^{350 SL} CALCIO							
	Falsa araña roja Eulia			bifentrin^{100 EC} 60 cc/100 L						
Ácaros e Insectos	Arañitas			abamectin^{18 EC} 60 - 100 cc/100 L espirodiclofen^{240 SC} 50 - 60 cc/100 L						
	Eulia			espinosad^{480 SC} 7 - 12 cc/100 L lambda^{50 EC} CIHALOTRINA 0,2 - 0,25 L/ha						
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50% WP} 200 - 300 g/ha simazina^{90% WG} 2 - 4 kg/ha								
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec^{480 SL} glifospecplus^{75% SG}						flumioxazin^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec^{480 SL} glifospecplus^{75% SG}		
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec^{480 SL} 2 - 7 L/ha (1)		glifospecplus^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha (1)				
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim^{240 EC} 0,4 - 2 L/ha					
Otros	Uniformar brotación		cianamida^{500 SL}							

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.