

Programa Nutra•Especialidades **cítricos**



Aplicación foliar

Aplicación foliar y/o al suelo vía riego

Aplicación al suelo vía riego

Brotación	Botón floral	Floración	Cuaja	Fruto cuajado	Crecimiento de fruto	Pre-cosecha	Post-cosecha
	microquel ^{BORO} 1 - 2 L/ha			microquel ^{BORO} 1 - 2 L/ha			
microquel ^{ZINC} 1,5 - 2 L/ha					zincfull [.] 1,5 - 2 L/ha		microquel ^{ZINC} 1,5 - 2 L/ha zincfull [.] 1,5 - 2 L/ha
		macroquel ^{CALCIO FULL} 1,5 - 3 L/ha (foliar)					
					macroquel ^{MAGNESIO} 2 - 3 L/ha		
					macroquel ^{POTASIO} 2,5 - 6 L/ha		
nutra brotación [?] 4 - 5 L/ha							
						nutra madurez ^{•••} 4 - 6 L/ha	
					cover sol ⁺ PLUS [®] 15 - 50 kg/ha		
amin ¹⁵ 2 - 4 L/ha					amin ⁸⁰ 0,5 - 1 kg/ha al follaje 1 - 2 kg/ha al suelo		
ascophyllum ^{GROW-480 SL} 1 - 2 L/ha				ascophyllum ^{ULTRA-DRY} 1 - 2 kg/ha al suelo			
			fosfonat ⁴⁰⁻²⁰ 3 - 5 L/ha fosfonat ^{NEUTRO} 6 - 8 L/ha				fosfonat ⁴⁰⁻²⁰ 3 - 5 L/ha fosfonat ^{NEUTRO} 6 - 8 L/ha
	humiful ^{26SL} 50 - 100 L/ha/temporada		humiful ^{90PS} 15 - 20 kg/ha/temporada				humiful ^{26SL} 50 - 100 L/ha/temporada humiful ^{90PS} 15 - 20 kg/ha/temporada
		calciomax ^{35-FLO} 35 - 100 kg/ha/temporada		calciosmart ^{•••} 10 - 40 L/ha/temporada.			
	rizogenplus [•] 2 - 4 L/ha						rizogenplus [•] 2 - 4 L/ha

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.