

Programa fitosanitario **pomáceas**



Pomáceas

Enfermedades

Ácaros e Insectos

Malezas

Previo a caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Botón floral	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Hongos de la madera	podaspec								
Reducir presión de enfermedades	polisulfuro								
Tizón de la flor (peral) <i>Pseudomonas syringae</i>	piraclostrobin		piraclostrobin						
Pudrición calicinal (<i>Botrytis cinerea</i>) Moho azul (<i>Penicillium expansum</i>)			acierto						
Venturia Oídio			acierto 75 cc/100 L (manzano) difenoconazol 10 - 15 cc/100 L (acción complementaria sobre corazón mohoso y pudrición calicinal) kresoxim 13 cc/100 L miclobutanil 10 - 12,5 g/100 L						
			tebuconazol 120 g/100 L fungi full 65 cc/100 L (manzano)						
Ojo de buey (manzano)							kresoxim 13 cc/100 L piraclostrobin 0,5 - 0,7 L/ha		
Reducir presión de plagas	polisulfuro								
Escama de San José	piriproxifen								
Tips Eulia			espinosad						
Arañitas				abamectin					
							espirodiclofen		espirodiclofen
Polillas Eulia							clorantniliprol 20 cc/100 L metoxifenozid 20 cc/100 L		
Escama de San José Polilla de la manzana Chanchitos blancos							tiacloprid		
Escama de San José Polilla de la manzana Chanchitos blancos Trips californiano Langostino							acetamiprid 40 g/100 L (langostino: 15 g/100 L) acetamiprid 12 g/100 L (polilla: 12 - 15 g/100 L, langostino: 5 g/100L)		
Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin 200 - 300 g/ha simazina 2 - 4 kg/ha								
Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin 50 - 100 g/ha + glifospec o glifospec plus								flumioxazin 50 - 100 g/ha + glifospec o glifospec plus
Post-emergente: anuales y perennes			glifospec 2 - 7 L/ha (1)	glifospec plus 1,1 - 4 kg/ha (1)					
Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim					

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.